Προηγμένο επίθεμα, σε μορφή φιλμ, για την επούλωση τραυμάτων
Pasament avansat tip film pentru plăgi
Advanced film-forming wound dressing

Stratamed®

advanced film-forming
wound dressing

[GR] Πληροφορίες για τον ασθενή

Επίθεμα πλήρους κάλυψης για άμεση επαφή με το τραύμα που εξασφαλίζει ένα υγρό περιβάλλον για την επούλωση των πληγών και την πρόληψη των παραμορφωτικών ουλών.

Το Stratamed είναι ένα ημιπερατό, αυτοσταθεροποιούμενο μη κολλώδες επίθεμα τραύματος το οποίο προσκολλάται ελαφρά και καλύπτει την επιφάνεια του κατεστραμμένου δέρματος.

Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, το Stratamed στερεοποιείται ταχέως δημιουργώντας μία προστατευτική μεμβράνη διαπερατή από αέρια και αδιαπέρατη από υγρά (αδιάβροχη), η οποία διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία επούλωσης και προστατεύει το προσβεβλημένο δέρμα ή τα ανοιχτά τραύματα από χημική και μικροβιακή διήθηση.

Το Stratamed μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε νωπή χειρουργική τομή ή εκτομή, ανοικτά τραύματα και δερματικές επιφάνειες που έχουν υποστεί λύση της συνέχειάς τους, χημική απολέπιση (πήλινγκ), εκδορές (γδαρσίματα), εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού και μετά από ακτινοθεραπεία.

Το Stratamed είναι βακτηριοστατικό και αδρανές.

Για ανοιχτά τραύματα και δέρμα που έχει υποστεί λύση:

Όταν το Stratamed στερεοποιηθεί, δημιουργεί ένα λεπτό επίθεμα τραύματος το οποίο διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία επούλωσης και προστατεύει τις προσβεβλημένες περιοχές. Το Stratamed βοηθάει να δημιουργηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον επούλωσης για επιφανειακά τραύματα και εγκαύματα. Το περιβάλλον αυτό οδηγεί σε ταχύτερη επιθηλιοποίηση και μείωση της φλεγμονώδους απόκρισης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο αποθεραπείας.

Το Stratamed δε δεσμεύεται ισχυρά πάνω στο τραύμα ή στον νεοσύστατο κοκκώδη ιστό.

Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς προστατευτική επίδεση.

Για πρόληψη και θεραπεία παραμορφωτικών ουλών:

Το Stratamed μαλακώνει και εξομαλύνει τις ουλές και επιτρέπει την ομαλοποίηση του κύκλου σύνθεσης του κολλαγόνου.

Το Stratamed ανακουφίζει από τον κνησμό και τη δυσφορία, και μειώνει την ερυθρότητα και τον αποχρωματισμό της επιδερμίδας που προκαλούν οι ουλές και οι βλάβες του δέρματος.

Το Stratamed μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες του δέρματος, ακόμη και σε εκτεθειμένες περιοχές όπως το πρόσωπο και ο λαιμός καθώς και στις αρθρώσεις και τις τριχωτές επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται ξύρισμα.

Το Stratamed αναπτύχθηκε για χρήση σε κάθε είδους επιφανειακά τραύματα, εγκαύματα, εκδορές και αποξέσεις περιλαμβανομένων και αυτών που προκαλούνται από:

- Οποιαδήποτε χειρουργική και κοσμητική επέμβαση
- Τραύματα
- Εγκαύματα
- Ακτινοθεραπείες
- Δήγματα
- Εκδορές(γδαρσίματα)
- Θεραπείες με χρήση laser, περιλαμβανόμενης και της αφαίρεσης τατουάζ
- Χημική απολέπιση (πήλινγκ)
- Δερματική απόξεση
- Κρυοθεραπεία
- Θεραπεία για τα σημάδια της ακμής και άλλες δερματικές παθήσεις

Ενδεδειγμένη χρήση

Το Stratamed μπορεί να εφαρμοστεί σε ανοιχτά τραύματα, εγκαύματα και περιοχές όπου το δέρμα έχει υποστεί λύση της συνέχειας του.

Το Stratamed χρησιμοποιείται για:

- Την προστασία και τη διατήρηση βέλτιστης υγρασίας επούλωσης σε επιφανειακά τραύματα, εγκαύματα και δέρμα που έχει υποστεί λύση.
- Για την πρόληψη και θεραπεία των υπερτροφικών, των χηλοειδών και των εκτεταμένων ουλών.

Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επεμβατικές μεθόδους μείωσης των ουλών, ώστε να βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα, όπως χειρουργική εκτομή και σύγκλιση, ενδοβλαβική έγχυση στεροειδών, θεραπείες laser και χρήση πιεστικών επιδέσμων.

Το Stratamed δεν περιέχει στεροειδή, αλκοόλ, parabens η αρώματα και είναι διαφανές και άοσμο.

Το Stratamed είναι κατάλληλο για παιδιά ή άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρέφη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο του θηλασμού.

Το Stratamed προορίζεται για χρήση από έναν και μόνο ασθενή.



Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τα σωληνάρια των 5, 10 & 20 g, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας, κόψτε το στόμιο του σωληναρίου και ασφαλίστε μετά τη χρήση.



Στα σωληνάρια των 50 g, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας, στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και ασφαλίστε μετά τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το προσβεβλημένο δέρμα ή το τραύμα είναι καθαρό. Απομακρύνετε όσο γίνεται περισσότερο εξίδρωμα ή υγρό από το τραύμα πριν την εφαρμογή του επιθέματος.

Για καλύτερα αποτελέσματα το Stratamed θα πρέπει να παραμένει σε συνεχή επαφή με το δέρμα.

Σε δέρμα που φέρει τραύμα ή έχει υποστεί λύση της συνέχειάς του και δεν απαιτείται περίδεση:
Απλώστε μία πολύ λεπτή στρώση Stratamed στην προσβεβλημένη περιοχή και αφήστε να στερεοποιηθεί. Όταν απλωθεί σωστά στις προσβεβλημένες περιοχές, το Stratamed θα πρέπει να στερεοποιηθεί σε 5–6 λεπτά. Εάν παραμένει νωπό πέραν αυτού του χρόνου πιθανά έχετε εφαρμόσει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Απομακρύνετε την περίσσεια με γάζα ή καθαρό χαρτομάντηλο και αφήστε το υπόλοιπο να στερεοποιηθεί.

Το Stratamed θα πρέπει να εφαρμόζεται μία φορά την ημέρα ή δύο φορές σε εκτεθειμένες περιοχές ή όπως σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Αφού στερεοποιηθεί, το Stratamed μπορεί να καλυφθεί από αντηλιακή κρέμα, μακιγιάζ, πιεστικούς επιδέσμους ή εκμαγεία.

Εάν το Stratamed αφαιρεθεί κατά το πλύσιμο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στην πάσχουσα περιοχή.

Σε δέρμα με βλάβες ή σε τραύματα τα οποία απαιτούν περίδεση:
Απλώστε μία πολύ λεπτή στρώση Stratamed και αφού στερεοποιηθεί καλύψτε με την επίδεση. Δεν είναι απαραίτητο να στεγνώσει.

Το Stratamed θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά σε κάθε αλλαγή της επίδεσης ή ανάλογα με την πορεία επούλωσης του τραύματος ή ανάλογα με τη σύσταση του γιατρού σας.

Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας

Το Stratamed συστήνεται για άμεση θεραπεία μετά τις διάφορες επεμβάσεις και θα πρέπει να συνεχίζεται έως την πλήρη αποκατάσταση του δέρματος.

Σε διεργασίες resurfacing και σε επεμβατικές διαδικασίες, η συνεχής χρήση συστήνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες ή μέχρι να μην παρατηρείται περεταίρω βελτίωση.

Για την πρόληψη των παθολογικών ουλών, η χρήση του Stratamed συνιστάται για 60–90 ημέρες το ελάχιστο. Μεγαλύτερες ουλές πιθανά να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Συνιστάται η χρήση έως ότου δεν φαίνεται περαιτέρω βελτίωση της ουλής.

Πόσο Stratamed θα χρειαστώ?

Το Stratamed έχει μια προηγμένη σύνθεση που απαιτεί λιγότερο προϊόν ανά εφαρμογή συγκρινόμενο με άλλα gel η κρέμες.

- **To Stratamed 5 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 2–4εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 10 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 5–8 εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 20 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 10–12 εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 50 g** επαρκεί για θεραπεία εκτεταμένης βλάβης εμβαδού 12εκ × 15εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 60ημέρες.

Προσοχή

- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Το Stratamed δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους οφθαλμούς.
- Το Stratamed δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από άλλες θεραπείες του δέρματος χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας.
- Το Stratamed μπορεί να ρυπάνει τα ρούχα αν δεν έχει στερεοποιηθεί εντελώς. Εάν αυτό συμβεί, το στεγνό καθάρισμα μπορεί να αφαιρέσει το Stratamed χωρίς να υποστεί κάποια βλάβη το ύφασμα.
- Για σωστή φύλαξη, παρακαλώ ασφαλίστε το σωληνάριο με το καπάκι μετά τη χρήση.
- Εάν το τραύμα σας εμφανίσει σημεία λοίμωξης ή καθυστερεί η επούλωση του μετά από 30 ημέρες χρήσης του προϊόντος, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, διακόψετε τη χρήση και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Δεν είναι κατάλληλο για υγρές, έντονα εξιδρωματικές πληγές, εγκαύματα 3ου βαθμού και συρίγγια.
- Κρατάτε όλα τα φάρμακα σας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης (EXP) που αναγράφεται στο σωληνάριο. Η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει από τη στιγμή που θα ανοιχθεί το σωληνάριο.
- Μην χρησιμοποιείται αν το σωληνάριο έχει υποστεί φθορά.
- Δεν απαιτούνται ειδικές μέθοδοι απόρριψης για το Stratamed. Παρακαλώ ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη.
- Εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης, σοβαρά συμβάντα σχετιζόμενα με τη χρήση του Stratamed θα πρέπει να αναφέρονται στην Stratpharma και στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή στη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης.

ΣΤΕΙΡΟ ΕΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συστατικά: Polysiloxanes, siloxane resin

[RO] Informaţii pentru pacienţi

Pansament flexibil pentru contactul direct cu plaga care asigură un mediu umed de vindecare a rănilor şi prevenirea cicatricilor anormale.

Stratamed este o formulă de gel semi-ocluziv, cu autouscare, neaderent şi transparent, care se lipeşte uşor de cea mai superficială piele detericorată.

Atunci când este utilizat conform instrucţiunilor, Stratamed se usucă pentru a forma un strat protector permeabil la gaze şi rezistent la apă, care hidratează şi protejează zonele de piele compromise şi rănile deschise împotriva invaziei chimice şi microbiene.

Stratamed poate fi aplicat pe inciziile şi exciziile recente, pe rănile deschise şi pe suprafeţele cutanate compromise, inclusiv cele rezultate în urma tratamentelor cu laser, peelingurilor chimice, abraziunii dermice, arsurilor de gradul 1 şi 2 şi radioterapiei.

Stratamed gel este bacteriostatic şi inert.

Pentru plăgi deschise şi piele compromisă:
Stratamed se usucă pentru a forma un pansament subţire şi flexibil care hidratează şi protejează zonele afectate. Stratamed favorizează crearea unui mediu umed de vindecare a rănilor superficiale şi a arsurilor. Acest mediu duce la o reepitelizare mai rapidă şi la un răspuns inflamator redus, ceea ce reduce timpul de recuperare post-procedură.

Stratamed nu aderă puternic la patul plăgii sau la ţesutul de granulaţie nou format.

Stratamed poate fi utilizat cu sau fără un pansament protector secundar.

Pentru prevenirea şi tratarea cicatricilor anormale:
Stratamed înmoaie şi aplatizează cicatricile hipertrofice şi permite cicatricilor să îşi normalizeze procesul de sinteză a colagenului, producând o cicatrice matură normală.

Stratamed este utilizat pentru a ameliora pruritul şi disconfortul şi pentru a reduce roşeaţa şi decolorarea asociate cu pielea deteriorată şi plăgile deschise.

Stratamed poate fi aplicat cu uşurinţă pe toate zonele pielii, inclusiv pe zonele expuse, cum ar fi faţa şi gâtul, precum şi pe articulaţii şi zonele acoperite cu păr, fără a fi nevoie de îndepărtarea acestuia.

Stratamed a fost dezvoltat pentru utilizarea pe toate tipurile de răni superficiale, arsuri, lacerații și abraziuni ale pielii, inclusiv cele rezultate în urma:

- Chirurgiei generale şi estetice
- Traumatismelor
- Arsurilor
- Radioterapiei
- Muşcăturilor
- Zgârieturilor
- Terapiei laser, inclusiv pentru îndepărtarea tatuajelor
- Post peeling chimic
- Dermabraziunii
- Crioterapiei
- Acnee şi alte afecţiuni cutanate

Indicații

Stratamed poate fi aplicat pe răni deschise, arsuri şi zone în care integritatea pielii a fost compromisă.

Stratamed este recomandat pentru:

- Protecţia şi hidratarea rănilor superficiale, a arsurilor şi a pielii compromise.
- Prevenirea şi tratamentul cicatricilor cu exces de ţesut, cheloide şi hipertrofice.


Stratamed poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu alte terapii invazive de gestionare a cicatricilor pentru a îmbunătăţi rezultatele generale, inclusiv post excizii chirurgicale şi suturi, injectare intralezională cu produşi cortizonici, tratamentele laser şi bandaje compresive.

Stratamed nu conţine steroizi, alcool, parabeni sau parfumuri şi este transparent şi inodor.


Stratamed este potrivit pentru copii şi pentru persoanele cu piele sensibilă. Stratamed poate fi utilizat la nou-născuţi, în timpul sarcinii şi în timpul alăptării.

Stratamed este destinat utilizării pentru un singur pacient.

Instrucţiuni de utilizare



La prima utilizare a tuburilor de 5 g, 10 g şi 20 g, îndepărtaţi capacul, tăiaţi vârful tubului şi reînchideţi după administrare.



În cazul utilizării tubului de 50 g, îndepărtaţi capacul, apoi sigiliul de protecţie şi reînchideţi după administrare.

Asiguraţi-vă că plaga sau zona afectată este curată. Tamponaţi uşor cât mai mult exudat în exces sau fluidul plăgii din zona respectivă înainte de aplicare a gelului.

Pentru rezultate optime, Stratamed trebuie menţinut în contact direct şi continuu cu pielea (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână).

Pe pielea deteriorată sau lezată care nu necesită un pansament secundar:
Aplicaţi un strat foarte subţire de Stratamed pe zona afectată şi lăsaţi gelul să se usuce. Atunci când este aplicat corect pe zonele afectate, Stratamed ar trebui să se usuce în 5–6 minute. Daca procesul de uscare durează mai mult, înseamnă ca aţi aplicat o cantitate prea mare de gel. Îndepărtaţi uşor excesul cu un tampon curat pentru a permite uscarea produsului.

Stratamed trebuie aplicat o dată pe zi, sau de două ori pe zi pe zonele expuse sau conform recomandării medicului dumneavoastră. Odată uscat, Stratamed poate fi acoperit cu cremă de protecție solară, produse cosmetice, bandaje compresive sau ghips.

În cazul în care Stratamed a fost îndepărtat prin spălare, trebuie reaplicat.

Pe pielea deteriorată sau pe plăgile care necesită un pansament secundar:
Aplicați un strat subțire de Stratamed, apoi acoperiți cu pansamentul secundar. Nu este necesară uscarea produsului.

Stratamed trebuie reaplicat la schimbarea pansamentului sau la verificarea evoluției plăgii, sau conform recomandării medicului dumneavoastră.

Durata recomandată a tratamentului

Stratamed este recomandat pentru tratamentul imediat după procedură și trebuie continuat până la recuperarea completă a pielii.

Post proceduri ablative, se recomandă utilizarea continuă pentru un tratament minim de 30 de zile (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână) sau până când nu se mai observă nicio îmbunătățire.

Pentru prevenirea cicatricilor anormale, Stratamed este recomandat pentru un tratament minim de 60–90 de zile (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână). Plăgile sau cicatricile mai mari pot necesita o perioadă mai lungă de tratament.

Se recomandă continuarea utilizării până când nu se mai observă nicio îmbunătățire.

De cât Stratamed am nevoie?

Stratamed gel este o formulă avansată care necesită mult mai puțin produs pentru fiecare aplicare decât cremele sau gelurile obișnuite.

- **Stratamed 5 g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 2–4 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile.
- **Stratamed 10 g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 5–8 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile.
- **Stratamed 20 g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 10–12 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile sau o zona de 6×12 cm, 2 aplicări/zi timp de 60 de zile.
- **Stratamed 50 g** este suficient pentru tratamentul unei zone de 12×15 cm, 2 aplicări/zi timp de 60 de zile.

Avertizări

- Doar pentru uz extern.
- A se evita contactul cu ochii.
- Stratamed nu trebuie aplicat peste alte tratamente pentru piele fără autorizarea prealabilă a medicului dumneavoastră.
- Stratamed poate păta hainele dacă nu este complet uscat. În cazul în care apar pete, curățarea chimică ar trebui să fie capabilă să le îndepărteze fără a deteriora materialul.
- Pentru o păstrare corectă, vă rugăm să închideți bine tubul cu capacul prevăzut.
- În cazul în care rana dumneavoastră prezintă semne de infecție sau nu se vindecă după 30 de zile de la aplicarea inițială a produsului, consultați medicul dumneavoastră.
- În cazul în care apare o iritație cutanată, întrerupeți utilizarea și consultați medicul dumneavoastră.
- Nu se recomandă aplicarea pe răni foarte exsudative, tunelizate sau arsuri de gradul 3.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați după data de expirare (EXP) imprimată pe tub. Data de expirare (EXP) nu se modifică odată ce tubul a fost deschis.
- A nu se utiliza dacă tubul este deteriorat
- Stratamed nu necesită metode speciale de distrugere. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind distrugerea.
- În cadrul Uniunii Europene, incidentele severe legate de utilizarea Stratamed trebuie raportate către Stratpharma și către autoritatea competentă respectivă din țara în care este stabilit utilizatorul.

STERIL PÂNĂ LA DESCHIDERE

Ingrediente: Polisiloxani, rășină siloxanică

[EN] Consumer information

A full contact flexible wound dressing which provides an optimal wound healing environment and abnormal scar prevention.

Stratamed is a semi-occlusive, self-drying, non-sticky and transparent gel formulation that lightly bonds to the most superficial damaged skin.

When used as directed Stratamed dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and open wounds from chemical and microbial invasion.

Stratamed can be applied to fresh incisions and excisions, open wounds and compromised skin surfaces including those from post laser treatments, chemical peels, dermal abrasion, 1st and 2nd degree burns and radiation therapy.

Stratamed gel is bacteriostatic and inert.

For open wounds and compromised skin:
Stratamed dries to form a thin, flexible wound dressing which hydrates and protects affected areas. Stratamed helps create an optimal wound healing environment for superficial wounds and burns. This environment leads to faster re-epithelialization and a reduced inflammatory response, which reduces recovery time post-procedure .

Stratamed does not adhere strongly to the wound bed or the newly formed granulating tissue.

Stratamed can be used with or without a secondary protective dressing.

For abnormal scar prevention and treatment:
Stratamed softens and flattens raised scars and allows scars to normalize the collagen synthesis process, producing a normal mature scar.

Stratamed is used to relieve itching and discomfort and to reduce redness and discoloration associated with damaged skin and scars.

Stratamed can be easily applied to all areas of the skin, including exposed areas like the face and neck as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

Stratamed was developed for the use on all types of superficial wounds, burns, skin tears and abrasions including those resulting from:

- General and cosmetic surgery
- Trauma
- Burns
- Radiation therapy
- Bites
- Grazes
- Laser therapy, including tattoo removal
- Chemical peels
- Dermal abrasion
- Cryotherapy
- Acne and other diseases of the skin

Intended use

Stratamed may be applied to open wounds, burns and areas where skin integrity has been compromised.

Stratamed is used for:

- The protection and hydration of superficial wounds, burns and compromised skin.
- The prevention and treatment of keloids, hypertrophic and excessive scars.

Stratamed may also be used in conjunction with invasive scar management options to improve overall results, including surgical excision and resuturing, intralesional steroid injections, laser treatments and pressure garments.

Stratamed contains no steroids, alcohol, parabens or fragrances and is transparent and odourless.

Stratamed is suitable for children and people with sensitive skin. Stratamed may be used on infants, during pregnancy and while breastfeeding.

Stratamed is intended for single patient use

Directions for use



On first use of 5 g, 10 g and 20 g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use.



On 50 g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

Ensure that the affected skin or wound is clean. Gently pat dry as much excess exudate or wound fluid from the area as possible prior to gel application.

For best results Stratamed should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/7 days a week).

On damaged or broken skin not requiring a secondary dressing:
Apply a very thin layer of Stratamed to the affected area and allow the gel to dry. When applied correctly to the affected areas, Stratamed should be dry in 5–6 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue.

Stratamed should be applied once daily, or twice daily to exposed areas or as advised by your physician. Once dry, Stratamed may be covered by sunscreen, cosmetics, pressure garments or casts.

If Stratamed has been removed by washing, it should be reapplied.

On damaged skin or wounds requiring a secondary dressing:
Apply a thin layer of Stratamed then cover with the secondary dressing. Drying is not necessary.

Stratamed should be reapplied when changing the dressing or checking the wound progress, or as advised by your physician.

Recommended duration of treatment

Stratamed is recommended for immediate treatment post procedure and should be continued until the skin has fully recovered.

For resurfacing and ablative procedures, continued use is recommended for a minimum treatment of 30 days (24 hours a day/7 days a week) or until no further improvement is seen.

For abnormal scar prevention, Stratamed is recommended for a minimum treatment of 60–90 days (24 hours a day/7 days a week). Larger scars may take longer.

Continued use is recommended until no further improvement is seen.

How much Stratamed do I need?

Stratamed gel is an advanced formulation that requires substantially less product per application than typical creams or gels.

- **Stratamed 5 g** is enough to treat a 2–4 cm linear incision twice per day for over 90 days.
- **Stratamed 10 g** is enough to treat a 5–8 cm linear incision twice per day for over 90 days.
- **Stratamed 20 g)** is enough to treat a 10–12 cm linear incision twice per day for over 90 days or an area of 6×12 cm twice per day for over 60 days.
- **Stratamed 50 g** is enough to treat an area of 12×15 cm, twice per day for over 60 days.

Caution

- For external use only.
- Stratamed should not be placed in contact with the eyes.
- Stratamed should not be applied over other skin treatments without the advice of your physician.
- Stratamed may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your wound show signs of infection or fail to heal after 30 days of initial product application consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.
- Stratamed does not require special disposal methods. Please follow your local disposal regulations.
- Within the European Union, serious incidents related to the use of Stratamed should be reported to Stratpharma and the respective competent authority in the country the user is established.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polysiloxanes, siloxane resin

Stratpharma Switzerland
Heal Better™

www.stratamed.com

MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν Dispozitiv medical Medical device
	Συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης Consultați prospectul atașat Consult instructions for use
	Φυλάξετε μακριά από παιδιά A nu se lăsa la îndemâna copiilor Keep out of the reach of children
	Ανάλωση έως A se utiliza până la data de Use by date
LOT	Αριθμός παρτίδας Lot nr. Batch code
	ημερομηνία παραγωγής Data fabricației Date of manufacture
STERILE R	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας Sterilizat prin iradiere Sterilized using irradiation
	Σύστημα μονού στείρου φραγμού Sistem unic de protecție sterilă Single sterile barrier system
	Μην χρησιμοποιείται αν το σωληνάριο έχει υποστεί φθορά A nu se utiliza în caz de ambalaj deteriorat Do not use if the tube is damaged
	Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Ελβετία / Elveția / Switzerland
EC REP	Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie Straße 8, 79539 Lörrach, Γερμανία / Germania / Germany SRN: DE-AR-000047121
	Importer to the European Union: Stratpharma Limited, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 XT91, Δημοκρατία της Ιρλανδίας / Republica Irlandeză / Republic of Ireland
	Υπευθυνος διανομης για την Ελλαδα: Stratpharma Hellas Κλειθένους 171 κ Αριωνα 15344, Γέρακας Αττικής Τηλ: +30 21 60023683 gr.inquiries@stratpharma.com
	Distribuitor pentru România: Stratpharma România S.R.L. Adresă: Str. Jiului, Nr. 2, Et. 2, Sector 1, București ro.inquiries@stratpharma.com

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης / Data modificării informațiilor / Date of preparation of this information: 12/2025

CE 2797 MS000GRROPI10-1225