Stratamed®

Pansement filmogène
innovant

# Pansement avancé pour la guérison des plaies

## Guérison plus rapide et prévention anticipée des cicatrices anormales






www.stratamed.com

Stratpharma
Switzerland
Heal Better™

# L'importance du soin des plaies

Une plaie est un type de blessure où la peau est endommagée (profondément ou superficiellement). Immédiatement après que la peau soit blessée, elle réagit en déclenchant un processus de cicatrisation.

Le temps de guérison de la peau diffère et dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de blessure, l'âge et l'état de santé général. Il est important de **commencer par des soins adéquats des plaies le plus tôt possible** pour obtenir le meilleur résultat possible, réduire le risque d'infection et raccourcir le temps de récupération.

**Une bonne gestion des plaies et des soins post-opératoires sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats médicaux et esthétiques possibles, réduire les temps récupération et le risque de formation anormale de cicatrices.**[1]

# Le produit idéal pour le soin des plaies



**Certains pansements** peuvent entraîner des réactions allergiques en raison de leurs propriétés adhésives, tandis que leur **retrait régulier peut être douloureux s'ils adhèrent à la plaie.**

Les soins post-opératoires totalement occlusifs, comme les produits à base de pétrolatum (Aquaphor®), ne sont pas idéaux car ils peuvent retenir la chaleur, augmenter les rougeurs et l'inflammation, et potentiellement provoquer une macération cutanée et une dermatite de contact.[2]

Lorsqu'il s'agit de choisir un produit de soin post-intervention, il est crucial de prendre en compte des critères précis qui garantissent son efficacité.

### Un produit idéal pour le soin des plaies devrait répondre à ces exigences :[3]

- Transparent, permettant de suivre l'évolution de la guérison ✓
- Perméable aux gaz ✓
- Facile à appliquer, sur toutes les surfaces de plaies ✓
- Accélérer la guérison et réduire le temps de récupération ✓
- Réduire les symptômes, tels que les démangeaisons, l'enflure, les rougeurs et l'inconfort ✓
- Prévenir l'infection et le développement de cicatrices anormales ✓

**Stratamed a été développé avec une consistance spéciale, pour garantir qu'il reste en contact total avec le lit de la plaie ou la surface endommagée.**

# Stratamed® : une avancée dans la guérison des plaies

### AVANCEZ SUR LES CICATRICES :

Stratamed permet de commencer le processus de guérison plus tôt que jamais **(sur des plaies ouvertes et/ou avant le retrait des sutures).**

### PANSEMENT FLEXIBLE :

Contrairement à d'autres pansements, la **formulation auto-séchante** de Stratamed **s'adapte à tous les types de surfaces de plaies** et forme un **film protecteur et flexible sur la plaie.**

### BARRIÈRE À CONTACT TOTAL :

Stratamed maintient un contact direct avec la peau et peut être simplement réappliqué **sans avoir besoin d'être retiré,** contrairement aux pansements traditionnels.




### PROTECTION :

Stratamed protège la peau fragilisée contre les invasions microbiennes et chimiques, ce qui en fait une **alternative aux antibiotiques topiques** pour la protection des plaies contre les infections.[4]

# Stratamed® pour l'utilisation immédiatement après :

### Les procédures médicales :

- Incisions et excisions récentes
- Biopsies
- Chirurgie générale entraînant des sutures (par exemple, chirurgie de Mohs, césarienne)
- Plaies superficielles et profondes
- Brûlures du 1er et du 2nd degré
- Morsures et déchirures de la peau, écorchures et abrasions
- Peau fragilisée (érythème fessier, crevasses sur les mamelons, lésions dues à la pression et ampoules)

### Les procédures cosmétiques :

- Procédures de resurfaçage ablatif en plein champ
- Tatouage et détatouage, microblading
- Chirurgie esthétique du visage et du corps

# Stratamed® vs. antibiotique topique

Une étude de 231 patients a été menée aux États-Unis pour **comparer Stratamed® et Neosporin®** (triple antibiotique topique) en ce qui concerne le taux d'infection, la prévalence de la dermatite de contact et la qualité de la guérison.[4]




- Stratamed est aussi **efficace** que les antibiotiques topiques dans la prévention des infections, mais **sans le risque de dermatite de contact.**
- Stratamed **accélère la guérison, réduit les rougeurs et améliore la qualité des tissus nouvellement formés.**

### FILMOGÈNE, FLEXIBLE, CONTACT TOTAL
Stratamed est un pansement flexible à contact total qui forme un film fin et assure un contact constant avec la peau.

### PROTECTION
Stratamed protège la peau fragilisée contre les invasions chimiques et microbiennes, tout en réduisant le risque de dermatite de contact.


### PRÉVENTION DES CICATRICES ANORMALES
Stratamed permet de prévenir les cicatrices anormales immédiatement après l'intervention (avant le retrait des sutures).

### NON RÉACTIF
Stratamed est inerte, n'a pas de pH mesurable, ne contient pas d'alcool, de parabènes ou de parfums, ce qui le rend adapté aux enfants, aux personnes à la peau sensible, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

# Résultats cliniques avec Stratamed® : Avant et après


### Plaie chronique - cuir chevelu[5]
Traitement en monothérapie avec Stratamed.


4 mois après la chirurgie, début du traitement avec Stratamed


Après 7 jours de traitement avec Stratamed


### SCC (Squamous cell carcinoma) - tête[6]
Traitement en monothérapie avec Stratamed.


Début du traitement avec Stratamed


Après 2 mois de traitement avec Stratamed

### Incision linéaire - tête[7]
Traitement en monothérapie avec Stratamed.


Début du traitement avec Stratamed


Après 8 semaines de traitement avec Stratamed

### Brûlure au second degré - pied[8]
Traitement en monothérapie avec Stratamed.


Début du traitement avec Stratamed


Après 9 jours de traitement avec Stratamed

# Instructions d'utilisation

- Assurez-vous que la peau ou la plaie affectée est propre.
- Séchez doucement autant d'exsudat ou de liquide de la plaie que possible avant d'appliquer le gel.
- L'utilisation de Stratamed doit être poursuivie jusqu'à la guérison complète de la peau.

**Sur peau endommagée ou éraflée ne nécessitant pas de pansement secondaire :**



- Appliquez **une très fine** couche de Stratamed sur la zone affectée et **laissez le gel sécher.**
- Lorsqu'il est appliqué correctement sur les zones affectées, Stratamed devrait être sec en **5-6 minutes.** Si le séchage prend plus de temps, vous en avez probablement appliqué de trop. Retirez délicatement l'excédent avec un mouchoir propre ou une gaze et laissez le processus de séchage se poursuivre.
- Stratamed doit être appliqué **une fois par jour ou deux fois par jour** sur les zones exposées ou selon les conseils de votre médecin.
- Une fois sec, Stratamed **peut être recouvert** de crème solaire, de produits cosmétiques, de vêtements compressifs ou de plâtres.

**Sur peau endommagée ou une plaie nécessitant un pansement secondaire :**



- Appliquez une **fine couche** de Stratamed puis recouvrez avec un pansement secondaire. **Aucun séchage n'est requis.**
- Stratamed devrait être réappliqué lors du **changement de pansement ou de la vérification de l'évolution de la plaie,** ou selon les conseils de votre médecin.

# Instructions supplémentaires

**Stratamed est recommandé pour une utilisation immédiate après l'intervention, les accidents et les brûlures du 1er et du 2nd degré.** Cela permet une prévention anticipée des cicatrices anormales.

Pour obtenir les meilleurs résultats, Stratamed doit être maintenu en **contact permanent** avec la peau (24 heures par jour/7 jours par semaine).

Pour les procédures de resurfaçage et d'ablation, il est recommandé de poursuivre l'utilisation pendant au moins 30 jours (24 heures par jour/7 jours par semaine) ou jusqu'à ce qu'aucune nouvelle amélioration ne soit constatée.

# Tailles disponibles

Stratamed gel est une formulation avancée qui nécessite **beaucoup moins de produit** par application que les crèmes ou gels hydratants classiques.

## De quelle quantité de Stratamed® ai-je besoin ?

**5g** Suffit pour traiter une incision linéaire de 2 à 4 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours.

**10g** Suffit pour traiter une incision linéaire de 5 à 8 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours.

**20g** Suffit pour traiter une incision linéaire de 10 à 12 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours ou une zone de 6x12 cm deux fois par jour pendant plus de 60 jours.

**50g** Suffit pour traiter une surface de 12x15 cm deux fois par jour pendant plus de 60 jours.



# Stratamed® et Strataderm® la combinaison complète pour les soins post-procédure



## Immédiatement après l'opération

Stratamed®

Pansement filmogène innovant

### Étape 1 - Stratamed :
Guérison des plaies et prévention anticipée des cicatrices anormales



- Stratamed a été développé pour être utilisé sur **tous les types de plaies,** brûlures, déchirures cutanées et abrasions.

**www.stratamed.com**

- Stratamed permet de commencer la **prévention des cicatrices anormales immédiatement après la suture.**

## Après le retrait des sutures ou une fois la plaie guérie

Strataderm®

Gel spécialisé dans le traitement des cicatrices

### Étape 2 - Strataderm :
Pour le traitement professionnel des cicatrices anormales, anciennes et nouvelles.




- Strataderm est indiqué pour **tous les types de cicatrices,** anciennes ou récentes.

**www.strataderm.com**

- Il est cliniquement prouvé que Strataderm **prévient et traite les cicatrices anormales,** réduit l'épaisseur de la cicatrice, les symptômes et les effets secondaires, et **améliore l'aspect général de la cicatrice.**[9]

**Si vous avez des questions sur les produits Stratpharma, les commandes, l'approvisionnement, etc. contactez notre siège social :** +41 (0) 61 691 12 80 ou inquiries@stratpharma.com

**Attention :** Lisez toujours l'étiquette, utilisez uniquement comme indiqué. Pour usage externe uniquement. Consultez le mode d'emploi. Utilisez uniquement selon les instructions. Tenir hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice patient (PIL). **Ingrédients :** Polysiloxanes, résine de siloxane.

**Références :** 1. Upton, Z., et al. (2011). *Wounds International,* 2(1), pp. 1-2. 2. Gold, M., Biron, J. (2019). *J Cosmet Dermatol,* 18(2), pp. 524-529. 3. Marini, L., et al. (2017). *Dermatologic Surgery,* 43, S85-90. 4. Benedetto, AV, et al. (2021). *J Eur Acad Dermatol Venereol,* 35(1) pp. 247-255. 5. Monk, E., et al. (2014). *Dermatologic Surgery,* 40(1), pp. 76–79. 6. Cubiró Raventós, X., et al. (2018). *SKINmed.* 17(5), pp. 298–304. 7. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed,* 10, S1–S7 8. Data on file, 2016 (Hospital Municipal de Quemados. Buenos Aires, Argentina). Stratpharma AG. 9. Wiseman, J., et al. (2019). *Clinical Rehabilitation,* doi: 10.1177/0269215519877516..

**Fabriqué par :** Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Bâle, Suisse

CE 2797

Stratamed est un dispositif médical de classe IIa
Strataderm est un dispositif médical de classe I

Stratpharma Switzerland Heal Better™

SM-CH-019-1-0924