
Stratamed®

Pansement filmogène
innovant

Une avancée dans la guérison des plaies

Guérison plus rapide et prévention anticipée des cicatrices anormales





www.stratamed.com

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

L'importance du soin de la plaie

Les médecins pratiquent de nombreuses procédures complexes et diverses qui requièrent un haut niveau d'expertise. Malgré un traitement correct, même avec les technologies et les techniques les plus récentes, il existe certains facteurs de risque que le médecin ne peut pas contrôler, tels que **l'observance des soins de la plaie par le patient, le risque d'infection et d'autres complications liées à la guérison de la plaie, ainsi que la génétique.**[1]

Un retard d'épithélialisation de plus de 10 à 14 jours **augmente considérablement** l'incidence de la cicatrisation hypertrophique.[2]

Qu'il s'agisse d'une plaie chirurgicale, esthétique, aiguë ou chronique, **une bonne prise en charge de la plaie et des soins anticipés adéquats après l'intervention sont essentiels** pour obtenir le meilleur résultat médical et esthétique possible, réduire le risque d'infection et de formation de cicatrices anormales, raccourcir le temps de récupération et assurer la satisfaction globale du patient.[3]

L'apparence et les effets secondaires des cicatrices peuvent être **considérablement améliorés** si la prévention commence immédiatement après la suture ou une fois que la plaie est apparue.[4]

Traitement actuel et défis



Il existe de nombreuses options pour traiter les différentes plaies, mais de nombreux défis, tels que **la résistance aux antibiotiques, les recidives d'infection et l'utilisation de pansements non optimaux,** persistent.[5]

L'effet négatif significatif des antibiotiques topiques sur les plaies post-opératoires comprend le retard de guérison, la dermatite de contact allergique, la chondrite inflammatoire, l'anaphylaxie et le syndrome de Stevens-Johnson.[6]

75% des patients (aux États-Unis) utilisent encore des antibiotiques topiques à base de pétrolatum en vente libre, **sans** prescription médicale, et **21,6% d'entre eux développent une dermatite de contact.**[6]

Dans des études cliniques récentes, **Stratamed** a montré la même efficacité que les antibiotiques topiques* dans la **prévention des infections** à la suite d'interventions chirurgicales, mais **sans effets secondaires.**[6,7]

De nombreux **pansements physiques** ne conviennent qu'aux plaies situées sur des surfaces planes. Par conséquent, ces pansements physiques **ne permettent pas** d'entrer en contact total avec la surface d'un grand nombre de plaies (c'est-à-dire les plaies situées près des articulations, sur des zones très contournées, les plaies profondes ou "tunnel"). Les parties adhésives de ces pansements se sont également révélées être à l'origine de **réactions allergiques** entraînant des **retards ou des complications** dans la guérison de la plaie.[8-11]

Le **produit idéal pour le soin des plaies devrait être** transparent, perméable aux gaz et facile à appliquer sur toutes les surfaces de la plaie. En outre, il devrait accélérer le processus d'épithélialisation, réduire les symptômes (démangeaisons, gonflement, érythème et douleur), prévenir les infections et l'apparition de cicatrices anormales.[12]

*Bacitracine Zinc, Sulfate de Néomycine, et Sulfate de Polymyxine B (Neosporin® Original). | Bacitracine Zinc (Bacitracin®).

Stratamed® - pansement filmogène pour une guérison plus rapide des plaies et pour la prévention anticipée des cicatrices anormales

Il a été cliniquement prouvé que Stratamed guérit les plaies **2 fois plus vite**[13] que le traitement standard** des brûlures et **réduit le temps de récupération.**[14]

Stratamed permet de **prévenir les cicatrices** anormales immédiatement après la suture ou une fois que la plaie est apparue.

Stratamed est une **alternative viable aux antibiotiques topiques** dans la prévention des infections sans risque de dermatite de contact.[6]

Un tube de **Stratamed remplace plusieurs produits pour le soin des plaies** tels que les pansements traditionnels, hydrogels pour la guérison des plaies humides et les antibiotiques topiques utilisés pour la prévention des infections.

Stratamed est un dispositif médical de classe IIa.



**Traitement standard : pansements à base d'argent, collagénases, alginates

Indications pour Stratamed®


Stratamed est un pansement flexible et filmogène de pointe destiné à être utilisé **immédiatement** après des procédures médicales et esthétiques, sur des plaies aiguës ou chroniques et sur des surfaces cutanées fragilisées. Stratamed a été développé avec une consistance spéciale pour garantir qu'il reste en **contact total** avec le lit de la plaie ou la surface endommagée.

INDICATIONS/PROCÉDURES MÉDICALES

- Incisions chirurgicales et excisions
- Biopsies et ED & C's
- Chirurgie générale entraînant des sutures (par exemple, chirurgie de Mohs, césarienne)
- Plaies chroniques (par exemple, ulcères veineux, ulcères de pression et ulcères diabétiques)
- Brûlures du 1er et du 2nd degré
- Barrière cutanée endommagée par des accidents et/ou des traumatismes
- Cryochirurgie (par exemple, pour la kératose actinique) et dermabrasion
- Post-thérapie au 5-FU
- Tatouage médical (par exemple, après une reconstruction mammaire)
- Affections cutanées inflammatoires

INDICATIONS/PROCÉDURES COSMÉTIQUES

- Procédures au laser (ablatif plein champ)
- Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP)
- Peeling chimique (intermédiaire et profond)
- Chirurgie esthétique du visage (par exemple, blépharoplastie, lifting, rhinoplastie)
- Chirurgie esthétique du corps (augmentation/réduction mammaire, lifting, abdominoplastie)
- Détatouage
- Tatouage cosmétique et paramédical



Pourquoi Stratamed® est-il un produit innovant ?

PANSEMENT FILMOGÈNE
Stratamed gel sèche pour former un pansement mince et flexible qui assure un contact permanent et total avec la peau.

RÉÉPITHÉLIALISATION PLUS RAPIDE ET TEMPS DE RÉCUPÉRATION RÉDUIT
Stratamed favorise un environnement de guérison humide, ce qui accélère la réépithélialisation et réduit le temps de récupération.

PRÉVENTION DES CICATRICES ANORMALES
Stratamed permet de prévenir les cicatrices anormales immédiatement après l'intervention (avant le retrait des sutures).

HYDRATATION ET PERMÉABILITÉ AUX GAZ
Stratamed est semi-occlusif, ce qui permet à la peau de respirer et de rester hydratée.

SOULAGEMENT SYMPTOMATIQUE
Stratamed apporte un soulagement symptomatique des démangeaisons, des sensations de brûlure et de l'inconfort, et réduit les rougeurs et les décolorations associées à une peau endommagée.

PROTECTION
Stratamed est bactériostatique et protège la peau fragilisée contre les invasions chimiques et microbiennes, tout en réduisant le risque de dermatite de contact.

PANSEMENTS SECONDAIRES
Stratamed peut être utilisé avec ou sans pansement protecteur secondaire, en association avec d'autres thérapies de traitement des plaies et des agents topiques.

ZONES DIFFICILES À TRAITER
Stratamed convient aux zones exposées telles que le visage et le cou, ainsi qu'aux articulations et aux zones pileuses, sans qu'il soit nécessaire de les raser.

NON-RÉACTIF
Stratamed est inerte, il n'a pas de pH mesurable et ne contient pas de stéroïdes, d'alcool, de parabènes ou de parfums, ce qui le rend adapté aux nourrissons, aux enfants, aux personnes à la peau sensible, pendant la grossesse et l'allaitement.

FACILE À UTILISER
Stratamed est facile à appliquer, sans qu'il soit nécessaire de le retirer avant de le réappliquer, et peut être utilisé par les patients à domicile.



Stratamed® vs. antibiotiques topiques


Une étude ouverte, randomisée et en simple aveugle a été menée aux États-Unis sur 231 patients afin de **comparer Stratamed et une pommade antibiotique topique triple** (Bacitracin Zinc, Neomycin Sulfate et Polymyxin B Sulfate, Neosporin® Original) en ce qui concerne le taux d'infection, la prévalence de la dermatite de contact et la qualité de la guérison.[6]

JEADV JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY

Benedetto, AV, Staidle, JP, Schoenfeld, J., Benedetto, EA, Benedetto, PX (2021). 'Comparing the use of a novel antibiotic-free film-forming topical wound dressing versus a topical triple antibiotic in dermatologic surgical procedures including Mohs micrographic surgery', *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 35(1), pp. 247-255.

Scannez pour lire l'étude publiée

- Stratamed, en tant que gel sans antibiotique, **est une alternative viable** au triple antibiotique (TA) ou à tout autre produit à base de pétrolatum, avec ou sans antibiotiques.
- Stratamed est **aussi efficace que les TA** pour prévenir les infections sans risque de dermatite de contact.
- Stratamed favorise une **guérison plus rapide, une réduction de l'érythème et une meilleure qualité des tissus nouvellement formés.**




Résultats cliniques

Immédiatement après le traitement | Après 7 jours de traitement | Après 7 mois de traitement

Stratamed
Stratamed est bactériostatique



Pommade triple antibiotique
(Bacitracine Zinc, Sulfate de Néomycine et Sulfate de Polymyxine B, Neosporin® Original)



Une étude randomisée, en simple aveugle et divisée en deux parties, portant sur 19 patients, a été menée aux États-Unis **pour comparer Stratamed et un antibiotique topique** (Bacitracin Zinc, Bacitracin®) afin **d'évaluer l'œdème, l'érythème, les croûtes, la réponse à la guérison et les préférences en matière de résultats** après une transplantation capillaire FUE (Follicular Unit Extraction, extraction d'unités folliculaires).[7]


Scannez pour lire l'étude publiée

AESTHETIC SURGERY JOURNAL OPEN FORUM

James, IB, Turer, DM, DiBernardo, BE (2022). 'Comparison of a Novel Silicone Gel Wound Dressing vs Bacitracin After Follicular Unit Extraction Hair Transplantation', *Aesthetic Surgery Journal Open Forum*, 4, pp. 1-8


- Stratamed **évite les problèmes de résistance bactérienne** ou **d'altération significative du microbiome cutané.**
- **Une guérison plus rapide** a été observée **dès le premier jour** dans le groupe Stratamed.
- Stratamed est **aussi efficace que les antibiotiques topiques** pour réduire l'inflammation (œdème, érythème et croûtes).

Après 1 jour post-procédure



Stratamed | Antibiotique

Résultats cliniques : brûlures



Début du traitement avec Stratamed



Après 6 jours de traitement avec Stratamed

Brûlure avec retard de réépithélialisation - jambe[13]

- Stratamed n'a entraîné **aucune infection secondaire de la plaie ni réaction allergique.**
- Stratamed a montré une **incidence réduite de la douleur et des démangeaisons** par rapport au traitement standard.

Lucattelli, E., Cipriani, F., Pascone, C., Di Lonardo, A. (2021). 'Non-Healing Burn Wound Treatment With A Sterile Silicone Gel', *Annals of Burns and Fire Disasters*, 34(1), pp. 53-57.

*Traitement standard : pansements à base d'argent, collagénases, alginates

Stratamed **accélère le processus de guérison – guérison de la plaie 2 fois plus rapide** comparé au traitement standard.*

La moyenne pour atteindre 95% de réépithélialisation était de 5,4 jours dans le groupe Stratamed contre 12,5 jours dans le groupe de traitement standard.



Début du traitement avec Stratamed



Après 7 jours de traitement avec Stratamed



Après 18 jours de traitement avec Stratamed

Brûlure au second degré - visage[15]

Un garçon de 6 ans a subi une brûlure au second degré au visage.

Hospital Municipal de Quemados, Buenos Aires, Argentine



Début du traitement avec Stratamed



Après 6 jours de traitement avec Stratamed




Après 9 jours de traitement avec Stratamed


Brûlure au second degré - pied[15]

Un garçon de 2 ans a subi une brûlure au second degré sur le pied droit.

Hospital Municipal de Quemados, Buenos Aires, Argentine



Début du traitement avec Stratamed



Après 11 jours de traitement avec Stratamed




Après 36 jours de traitement avec Stratamed

Brûlure au second degré - poitrine[16]

Une femme de 75 ans a subi une brûlure au second degré non infectée de 5 x 4 cm sur le sein droit.

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelone, Espagne

Résultats cliniques : plaies chroniques



4 mois après la chirurgie, début du traitement avec Stratamed[17]



Après 7 jours de traitement avec Stratamed



2 ans après la chirurgie, début du traitement avec Stratamed[17]




Après 5 semaines de traitement avec Stratamed

Monk, E., et al. (2014). 'Successful Treatment of Nonhealing Scalp Wounds Using a Silicone Gel', *Dermatologic Surgery,* 40(1), pp. 76–79.



Début du traitement avec Stratamed[12]




Après 7 jours de traitement avec Stratamed



Après 6 semaines de traitement avec Stratamed


Marini, L et al. (2017). 'Importance of Scar Prevention and Treatment—An Approach From Wound Care Principles, *Dermatologic Surgery,* 43, S85-S90.



Avant le traitement avec Stratamed[18]



Immédiatement après le débridement de la grosse croûte. Début du traitement avec Stratamed



Après 2 semaines de traitement avec Stratamed

Uva, L., et al. (2015). 'Erosive pustular dermatosis successfully treated with a novel silicone gel', *International Journal of Dermatology,* 55(1), pp. 89–91.

« Nous pensons que ce gel est l'une des principales raisons pour lesquelles tous les patients ont constaté une amélioration et une guérison de leurs plaies du cuir chevelu après une période prolongée de non-guérison. »

« Stratamed pour nos patients utilise les propriétés uniques des gels filmogènes dans une formulation qui peut être idéale pour ces plaies. »

Prof. Anthony Benedetto, MD, DO, FACP,
Philadelphie, USA

- Stratamed sur les plaies chroniques fournit un « coup de pouce de guérison » efficace au tissu de granulation biologiquement inactif, induisant une réépithélialisation même après seulement 1 semaine de traitement.
- Stratamed est efficace pour traiter les lésions ulcéreuses persistantes secondaires à une intervention chirurgicale suivie de greffes cutanées d'épaisseur partielle.
- Stratamed empêche la macération des tissus sur la peau entourant la plaie, permettant des changements de pansements moins fréquents, bien que des pansements secondaires n'aient été nécessaires dans aucun des cas publiés.

Résultats cliniques : autres indications



Début du traitement avec Stratamed



Après 15 jours de traitement avec Stratamed



Après 40 jours de traitement avec Stratamed



Après 78 jours de traitement avec Stratamed



Après 90 jours de traitement avec Stratamed

*Traitement initial : hydrogel et hydrofibres avec alginate, collagénase avec pommade au chloramphénicol, huile de tournesol avec acides gras.

Ulcère de pression - Sacrum[19]

Homme de 26 ans présentant une lésion de pression au niveau du sacrum de grade 3 causée par une hospitalisation prolongée.

Antécédents d'obésité de grade II.

Taille de la plaie : 12 x 8 cm

Le temps de guérison attendu était de 1,5 à 3 ans avec le traitement* utilisé avant le début de l'application de Stratamed.


Après 7 jours de traitement, la réduction de l'exsudation et l'accélération du rapprochement des bords de la plaie ont été identifiées.

Après 90 jours de traitement, l'escarre a été guérie et le patient est sorti de l'hôpital.

Infirmière Vanessa Neckel, Brésil



Début du traitement avec Stratamed



Après 18 jours de traitement avec Stratamed




Après 31 jours de traitement avec Stratamed

SPD (Syndrôme du Pied Diabétique)[20]

Madrid, Espagne



Début du traitement avec Stratamed



Après 14 jours de traitement avec Stratamed



Après 21 jours de traitement avec Stratamed

Syndrome d'Ulcus Cruris (sévère)[21]

Jambe inférieure › 90 jours avec une plaie ouverte

Dr. Strohal, Federal Academic Teaching Hospital, Feldkirch, Autriche



Début du traitement avec Stratamed



Après 7 jours de traitement avec Stratamed

Plaie épaisse au niveau du site donneur[22]

Données d'archives, Stratpharma AG

Résultats cliniques : chirurgies



Début du traitement avec Stratamed



Après 10 jours de traitement avec Stratamed




Après 1 mois de traitement avec Stratamed

CBC (carcinome basocellulaire) - tête[16]

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelone, Espagne



Début du traitement avec Stratamed



Après 2 mois de traitement avec Stratamed

CEC (carcinome épidermoïde cutané) – tête[16]

Excision chirurgicale et reconstruction de lambeau cutané. Patient pré-diabétique.

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelone, Espagne



Début du traitement avec Stratamed



Après 2 mois de traitement avec Stratamed

Chirurgie de Mohs – lèvre[23]

Excision chirurgicale de la lèvre supérieure.

Données d'archives, Stratpharma AG



Début du traitement avec Stratamed



Après 8 semaines de traitement avec Stratamed

Incision linéaire – tête[14]

Dr. Sandhofer, Linz, Autriche

Résultats cliniques : procédures esthétiques



Avant la procédure



Post-procédure, début du traitement avec Stratamed



Après 7 jours de traitement avec Stratamed

Resurfaçage au laser (cicatrices d'acné)[14]

Traitement avec Stratamed en combinaison avec Thermage® et un resurfaçage au laser fractionné CO_2.

Dr. Sandhofer, Linz, Autriche



Avant la procédure



Pendant procédure, début du traitement avec Stratamed



Après 10 semaines de traitement avec Stratamed

Cicatrice hypertrophique après une chirurgie thoracique[14]

Traitement avec Stratamed en combinaison avec un resurfaçage au laser fractionné CO_2/Mosaïque et une radiofréquence.

Dr. Sandhofer, Linz, Autriche



Début du traitement avec Stratamed



Après 5 mois de traitement avec Stratamed

Cicatrice hypertrophique post mammoplastie de réduction[14]

Stratamé en combinaison avec un laser CO_2

Dr. Sandhofer, Linz, Autriche



Début du traitement avec Stratamed



Après 11 jours de traitement avec Stratamed

IPL (thérapie par lumière pulsée intense) – bras[24]

Sydney, Australie

Comment appliquer Stratamed® ?

- Assurez-vous que la peau ou la plaie affectée est propre.
- Séchez doucement autant d'exsudat ou de liquide de la plaie que possible avant d'appliquer le gel.

Sur peau endommagée ou éraflée ne nécessitant pas de pansement secondaire :




Appliquez une **très fine couche** de Stratamed sur la zone affectée et **laissez le gel sécher.**

Lorsqu'il est appliqué correctement sur les zones affectées, Stratamed devrait être sec en **5-6 minutes.** Si le séchage prend plus de temps, vous en avez probablement appliqué de trop. Retirez délicatement l'excédent avec un mouchoir propre ou une gaze et laissez le processus de séchage se poursuivre.

Stratamed doit être appliqué **une fois par jour ou deux fois par jour** sur les zones exposées ou selon les conseils du médecin.

Une fois sec, Stratamed peut être recouvert de crème solaire, de produits cosmétiques, de vêtements compressifs ou de plâtres.

Sur peau endommagée ou une plaie nécessitant un pansement secondaire :



Appliquez **une fine couche** de Stratamed puis recouvrez avec un pansement secondaire. Aucun séchage n'est nécessaire.

Il est conseillé de réappliquer Stratamed lors du **changement de pansement ou de la vérification de l'évolution de la plaie,** ou selon les conseils du médecin.

Instructions supplémentaires

- Pour de meilleurs résultats, Stratamed doit être maintenu en **contact continu** avec la peau **(24 heures par jour/7 jours par semaine).** Stratamed peut être réappliqué **plus souvent** pour assurer un contact constant avec la peau ou pour réduire les symptômes.
- Le lavage risque d'enlever Stratamed. Si tel est le cas, il est conseillé de le réappliquer.
- Stratamed peut être appliqué **directement** sur la plaie à l'aide du doigt, d'un coton-tige, etc.
- Stratamed **n'absorbera pas** l'exsudat ou le liquide de la plaie. Le film formé par Stratamed n'empêchera pas le liquide de s'évacuer de la plaie.
- Stratamed **n'a pas besoin d'être frotté ou massé,** car il ne pénètre pas en-dessous du niveau de la couche cornée et cela n'améliorera pas son effet.
- Stratamed peut être utilisé en association avec des pansements absorbants. Appliquez Stratamed directement sur la plaie ou sur le côté de contact du pansement secondaire.
- L'application de Stratamed sur les bords de la plaie aidera à prévenir la macération.
- S'il n'est pas complètement sec, Stratamed peut tacher les vêtements. Un lavage normal ne retirera pas le produit des vêtements. Si des taches apparaissent, le nettoyage à sec devrait pouvoir les éliminer sans endommager le tissu.

Stratamed® et d'autres produits

Stratamed **ne doit pas être appliqué par-dessus des médicaments topiques,** sauf avis contraire du médecin.

IMPORTANT :

Parce que Stratamed est semi-occlusif :

- Stratamed peut renforcer l'effet d'un ingrédient actif si Stratamed est appliqué par-dessus l'ingrédient actif.
- Stratamed peut empêcher ou réduire l'absorption des ingrédients actifs s'ils sont appliqués par-dessus Stratamed.

De quelle quantité de Stratamed® ai-je besoin ?



Stratamed est une formulation avancée qui nécessite **beaucoup moins de produit** par application que les crèmes ou gels hydratants classiques.



Stratamed 5g

est suffisant pour traiter une incision linéaire de 2 à 4 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours

Stratamed 10g

est suffisant pour traiter une incision linéaire de 5 à 8 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours

Stratamed 20g

est suffisant pour traiter une incision linéaire de 10 à 12 cm deux fois par jour pendant plus de 90 jours ou une zone de 6 x 12 cm deux fois par jour pendant plus de 60 jours

Stratamed 50g

est suffisant pour traiter une surface de 12 x 15 cm deux fois par jour pendant plus de 60 jours

Durée de traitement recommandée


- Stratamed est recommandé **pour un traitement immédiat après l'intervention** et devrait être poursuivi jusqu'à ce que la peau soit complètement rétablie.
- Pour les procédures de resurfaçage et d'ablation, une utilisation continue est recommandée pendant un **traitement minimum de 30 jours** ou jusqu'à ce qu'aucune amélioration supplémentaire ne soit constatée.

Une fois la plaie guérie ou les sutures retirées :

Strataderm® - pour la prévention et le traitement des cicatrices anormales, anciennes et nouvelles

Strataderm®
Gel spécialisé dans le traitement des cicatrices

- Facile à appliquer une fois par jour*
- Adoucit et aplatit les cicatrices en relief
- Soulage les démangeaisons et l'inconfort des cicatrices
- Réduit les rougeurs et la décoloration associées aux cicatrices



*Veuillez vous référer à la notice d'information patient (PIL).

Stratamed®

Pansement filmogène
innovant

Une avancée majeure dans la guérison des plaies et la prévention anticipée des cicatrices anormales

Stratamed :

- Est indiqué pour une utilisation immédiatement après des procédures esthétiques et médicales, sur des plaies chroniques ou aiguës et des surfaces cutanées fragilisées.
- Favorise un environnement de guérison humide conduisant à une réépithélialisation plus rapide et à une réduction des temps de récupé
- Permet de commencer la prévention des cicatrices anormales plus tôt que jamais (avant le retrait des sutures).
- Est perméable aux gaz, permettant à la peau de respirer et de rester hydratée.
- Est bactériostatique, réduisant le risque d'infection.
- Soulage les démangeaisons, l'inconfort et réduit les rougeurs et la décoloration associées à la peau endommagée.
- Est inerte, ne contient ni alcool, ni parabènes, ni parfums.
- Est facile à appliquer sur toutes les surfaces de la plaie sans avoir besoin de le retirer avant une nouvelle application.



Si vous avez des questions sur les produits Stratpharma, les commandes, l'approvisionnement, etc., contactez notre siège social : +41 (0) 61 691 12 80 ou inquiries@stratpharma.com

www.stratamed.com

Attention : Lisez toujours l'étiquette, utilisez uniquement comme indiqué. Pour usage externe uniquement. Stratamed ne doit pas être mis en contact avec les yeux. Stratamed ne doit pas être appliqué sur des médicaments topiques, sauf avis contraire de votre médecin. Stratamed peut tacher les vêtements s'ils ne sont pas complètement secs. Si des taches apparaissent, le nettoyage à sec devrait pouvoir les éliminer sans endommager le tissu. Pour un stockage correct, veuillez refermer hermétiquement le tube avec le bouchon. Si votre plaie présente des signes d'infection ou ne parvient pas à guérir après 30 jours d'application initiale du produit, consultez votre médecin. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. Ne convient pas aux plaies fortement exsudatives, plaies "tunnels" ou brûlures au 3e degré. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) imprimée sur le tube. La date de péremption (EXP) ne change pas une fois le tube ouvert. Ne pas utiliser si le tube est endommagé. Stratamed ne nécessite pas de méthodes de destructions spécifiques. Veuillez suivre vos réglementations locales en matière de destruction. Pour plus d'instructions, veuillez vous référer à la notice d'information du patient (PIL). Stérile jusqu'à ouverture. **Ingrédients :** Polysiloxanes, résine siloxane.

Références : 1. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(1), pp. 113-116. 2. Gauglitz, GG, et al. (2011). *Mol Med*, 17(1-2), pp. 113-125. 3. Upton, Z., et al. (2011). *Wounds International*, 2(1), pp. 1-2. 4. Bayat, A., et al. (2003). *BMJ*, 326, pp. 88-92. 5. Gold, M., Biron, J. (2019). *J Cosmet Dermatol*, 18(2), pp. 524-529. 6. Benedetto, AV, et al. (2021). *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 35(1) pp. 247-255. 7. James, IB, et al. (2022). *Aesthetic Surgery Journal Open Forum*, 4, pp. 1-8. 8. Whitney, J., et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 663-679. 9. Steed, DL, et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 680-692. 10. Hopf, HW, et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 693-710. 11. Bamberg, R., et al. (2002). *Wounds*, 14, pp. 314-327. 12. Marini, L., et al. (2017). *Dermatologic Surgery*, 43, S85-90. 13. Lucattelli, E., et al. (2021). *Annals of Burns and Fire Disasters*, 34(1), pp. 53-57. 14. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed*, 10, S1-S7. 15. Data on file, 2016 (Hospital Municipal de Quemados. Buenos Aires, Argentina). Stratpharma AG. 16. Cubiró Raventós, X., et al. (2018). *SKINmed*. 17(5), pp. 298-304. 17. Monk, E., et al. (2014). *Dermatologic Surgery*, 40(1), pp. 76-79. 18. Uva, L., et al. (2015). *International Journal of Dermatology*, 55(1), pp. 89-91. 19. Data on file, 2022 (Nurse Vanessa Neckel, Brazil), Stratpharma AG. 20. Data on file, 2010 (Madrid, Spain). Stratpharma AG. 21. Data on file, 2016 (Federal Academic Teaching Hospital. Feldkirch, Austria). Stratpharma AG. 22. Data on file. Stratpharma AG. 23. Presented in International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) 2015. (Spring) by Dr. Benedetto, Cartagena (Colombia). 24. Data on file (Sydney, Australia). Stratpharma AG.

Fabriqué par : Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Bâle, Suisse

CE 2797 Dispositif médical de classe IIa

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

SM-CH-028-1-0924