Stratamed®

Moderne filmbildende
Wundauflage

Fortschrittliche Wundheilungsauflage

Schnellere Heilung und frühzeitige Verhinderung anormaler Narben





www.stratamed.com

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

Die Bedeutung der Wundpflege

Eine Wunde ist eine Art von Verletzung, bei der die Haut (tief oder oberflächlich) beschädigt wird. Unmittelbar nach der Verletzung der Haut reagiert sie mit der Einleitung eines Wundheilungsprozesses.

Die Heilungsdauer der Haut variiert und hängt von mehreren Faktoren ab, einschliesslich der Art der Verletzung, des Alters und des allgemeinen Gesundheitszustands. Es ist wichtig, so **früh wie möglich mit angemessener Wundversorgung zu beginnen,** um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, das Infektionsrisiko zu verringern und die Heilungsdauer zu verkürzen.

Angemessene Wundbehandlung und Nachsorge sind entscheidend, um das bestmögliche medizinische und ästhetische Ergebnis zu erzielen, die Ausfallzeit zu verringern und das Risiko einer abnormalen Narbenbildung zu minimieren.[1]

Das ideale Wundpflegeprodukt



Bestimmte Auflagen können aufgrund ihrer Klebeeigenschaften allergische Reaktionen hervorrufen, und ihre regelmässige **Entfernung kann schmerzhaft sein, wenn sie an der Wunde haften.**

Vollständig okklusive Nachsorgeprodukte, wie Erdöl-basierte Produkte (z.B. Aquaphor®), sind nicht ideal, da sie Wärme zurückhalten, Rötungen und Entzündungen verstärken und möglicherweise Hautmazeration und Kontaktdermatitis verursachen können.[2]

Bei der Auswahl eines Nachsorgeprodukts ist es wichtig, spezifische Kriterien zu berücksichtigen, die seine Wirksamkeit sicherstellen.

Ein ideales Wundpflegeprodukt sollte diese Anforderungen erfüllen:[3]

- Transparent, um den Heilungsfortschritt zu überwachen ✓
- Gasdurchlässig ✓
- Einfach anzuwenden, auf allen Wundoberflächen ✓
- Heilung beschleunigen und Erholungsdauer verkürzen ✓
- Symptome wie Juckreiz, Schwellungen, Rötungen und Unbehagen lindern ✓
- Infektionen und die Entstehung von abnormalen Narben verhindern ✓

Stratamed wurde mit einer speziellen Konsistenz entwickelt, um sicherzustellen, dass es in vollem Kontakt mit dem Wundbett oder der beschädigten Oberfläche bleibt.

Stratamed®: Ein Durchbruch in der Wundheilung

NARBEN ZUVORKOMMEN:

Stratamed ermöglicht es, den Heilungsprozess früher als je zuvor zu beginnen **(auf offenen Wunden und/oder vor der Entfernung von Nähten).**

FLEXIBLE WUNDAUFLAGE:

Im Gegensatz zu anderen Wundauflagen **passt** sich die **selbsttrocknende Formulierung** von Stratamed **allen Arten von Wundoberflächen** an und bildet einen **schützenden, flexiblen Film über der Wunde.**

VOLLKONTAKT-BARRIERE:

Stratamed bleibt in direktem Kontakt mit der Haut und kann einfach wieder aufgetragen werden, **ohne dass es entfernt werden muss,** im Gegensatz zu traditionellen Verbänden.

SCHUTZ:

Stratamed schützt die geschädigte Haut vor dem Eindringen von Mikroorganismen und Chemikalien und ist damit eine **Alternative zu topischen Antibiotika** zum Schutz vor Infektionen.[4]



Stratamed® für die unmittelbare Nutzung nach:

Medizinischen Behandlungen:


- Frische Inzisionen und Exzisionen
- Biopsien
- Allgemeinchirurgie mit Nähten (z.B. Mohs-Chirurgie, Kaiserschnitt)
- Oberflächliche und tiefe Wunden
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades
- Bisse und Hautrisse, Schürfwunden und Abschürfungen
- Geschädigte Haut (z.B. Windelausschlag, rissige Brustwarzen, Druckgeschwüre und Blasen)

Kosmetische Behandlungen:

- Ablative Vollfeld-Regenerierung
- Tätowierungen und Tätowierungsentfernung, Microblading
- Kosmetische Chirurgie im Gesicht und am Körper

Stratamed® vs. topische Antibiotika

Eine Studie mit 231 Patienten wurde in den USA durchgeführt, um **die Infektionsrate, die Häufigkeit von Kontaktdermatitis und die Heilungsqualität von Stratamed® und Neosporin®** (topisches Dreifach-Antibiotikum) **zu vergleichen.**[4]



- Stratamed ist bei der Vorbeugung von Infektionen **genauso wirksam** wie topische Antibiotika, **ohne das Risiko einer Kontaktdermatitis.**
- Stratamed **beschleunigt die Heilung, verringert Hautrötungen und verbessert die Qualität des neu gebildeten Gewebes.**

FILMBILDEND, FLEXIBEL, VOLLKONTAKT

Stratamed ist eine flexible, vollkontaktfähige Wundauflage, die einen dünnen Film bildet und ständigen Kontakt mit der Haut sicherstellt.

SCHUTZ

Stratamed schützt die geschädigte Haut vor chemischen und mikrobiellen Einflüssen, während es das Risiko von Kontaktdermatitis verringert.

PRÄVENTION ABNORMALER NARBEN

Stratamed ermöglicht die sofortige Prävention abnormaler Narbenbildung nach dem Eingriff (vor der Nahtentfernung).

NICHT REAKTIV

Stratamed ist inert, hat keinen messbaren pH-Wert, enthält keinen Alkohol, keine Parabene oder Duftstoffe und ist daher geeignet für Kinder, Menschen mit empfindlicher Haut, schwangere Frauen und stillende Mütter.

Klinische Ergebnisse mit Stratamed®: Vorher und Nachher

Chronische Wunde- Kopfhaut[5]

Behandlung mit Stratamed als Monotherapie.



4 Monate nach dem Eingriff, Beginn der Behandlung mit Stratamed




Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed

SCC (Plattenepithelkarzinom) – Kopf[6]

Behandlung mit Stratamed als Monotherapie.



Beginn der Behandlung mit Stratamed




Nach 2 Monaten der Behandlung mit Stratamed

Linearer Einschnitt – Kopf[7]

Behandlung mit Stratamed als Monotherapie.



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 8 Wochen der Behandlung mit Stratamed

Verbrennung zweiten Grades – Fuss[8]

Behandlung mit Stratamed als Monotherapie.



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 9 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Gebrauchsanweisung

- Stellen Sie sicher, dass die betroffene Haut oder Wunde sauber ist.
- Tupfen Sie vorsichtig so viel überschüssiges Exsudat oder Wundflüssigkeit wie möglich ab, bevor Sie das Gel auftragen.
- Die Anwendung von Stratamed sollte fortgesetzt werden, bis die Haut vollständig geheilt ist.

Bei geschädigter oder rissiger Haut, die keinen Sekundärverband erfordert:



- Tragen Sie eine **sehr dünne Schicht** Stratamed auf die betroffene Stelle auf und lassen Sie das Gel trocknen.
- Bei ordnungsgemässer Anwendung auf den betroffenen Hautstellen sollte Stratamed innerhalb von **5–6 Minuten** getrocknet sein. Sollte die Trockenzeit überschritten werden, wurde ggf. zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Mull abtupfen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen.
- Stratamed sollte **ein- bis zweimal täglich,** oder wie von Ihrem Arzt verordnet, auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden.
- Nach dem Trocknen **können** auf Stratamed Sonnencremes oder Kosmetika **aufgetragen,** sowie Druck- oder Gipsverbände angelegt werden.

Bei geschädigter Haut oder Wunden die einen Sekundärverband erfordern:



- Stratamed **dünn auftragen** und anschliessend mit dem Sekundärverband abdecken. **Trocknen ist nicht notwendig.**
- Stratamed sollte **beim Wechseln des Verbandes oder beim Überprüfen des Wundfortschritts** erneut aufgetragen werden, oder nach Anweisung Ihres Arztes.

Zusätzliche Hinweise

Stratamed wird für den sofortigen Einsatz nach Eingriffen, Unfällen sowie bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades empfohlen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Prävention abnormaler Narbenbildung.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Stratamed **dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist** (24 h / Tag, 7 Tage / Woche).

Bei Regenerierungs- und Ablativbehandlungen wird eine fortgesetzte Anwendung für eine Mindestbehandlungsdauer von 30 Tagen (24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche) oder bis keine weiteren Verbesserungen mehr sichtbar sind, empfohlen.

Erhältliche Grössen

Stratamed-Gel ist eine fortgeschrittene Formulierung, die pro Anwendung **erheblich weniger Produkt** erfordert als typische Feuchtigkeitscremes oder -gele.



Wie viel Stratamed® benötige ich?

5g	Ausreichend für die Behandlung eines linearen Einschnitts von 2-4 cm zweimal am Tag für über 90 Tage.
10g	Ausreichend für die Behandlung eines linearen Einschnitts 5-8 cm zweimal am Tag für über 90 Tage.
20g	Ausreichend für die Behandlung eines linearen Einschnitts von 10-12 cm zweimal am Tag für über 90 Tage zu behandeln oder einer Fläche von 6 x 12 cm zweimal am Tag für über 60 Tage.
50g	Ausreichend für die Behandlung einer Fläche von 12 x 15 cm, zweimal am Tag für über 60 Tage.



Stratamed® and Strataderm®
die vollständige Kombination für die Nachsorge nach Eingriffen



Unmittelbar nach einem Eingriff

Stratamed®

Moderne filmbildende Wundauflage

Schritt 1 – Stratamed:
Wundheilung und frühzeitige Prävention abnormaler Narbenbildung



- Stratamed wurde für die Anwendung bei **allen Arten von Wunden,** Verbrennungen, Hautrissen und Abschürfungen entwickelt.
- Mit Stratamed kann die Vorbeugung von abnormaler Narbenbildung unmittelbar nach der Naht beginnen.

www.stratamed.com

Nach Entfernung der Naht oder sobald die Wunde verheilt ist

Strataderm®

Gel zur Behandlung von Narben

Schritt 2 – Strataderm:
Für die professionelle Behandlung von abnormen Narben, sowohl alten als auch neuen



- Strataderm ist für die Anwendung bei allen Arten von Narben, sowohl alten als auch neuen, geeignet.
- Strataderm ist klinisch erwiesen, **abnormale Narben zu verhindern und zu behandeln,** die Narbendicke zu reduzieren, Symptome und Nebenwirkungen zu lindern und **das Gesamtbild der Narbe zu verbessern.**[9]

www.strataderm.com

Falls Sie Fragen zu den Produkten von Stratpharma, Bestellungen, der Versorgung usw. haben, kontaktieren Sie bitte unsere Zentrale unter: +41 (0) 61 691 12 80 oder inquiries@stratpharma.com

Achtung: Lesen Sie stets die Packungsbeilage und verwenden Sie das Produkt nur wie angewiesen. Nur zur äusseren Anwendung. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Anweisungen finden Sie in der Packungsbeilage (PIL). **Wirkstoffe:** Polysiloxane, Siloxanharz

Quellen: 1. Upton, Z., et al. (2011). *Wounds International,* 2(1), pp. 1-2. 2. Gold, M., Biron, J. (2019). *J Cosmet Dermatol,* 18(2), pp. 524-529. 3. Marini, L., et al. (2017). *Dermatologic Surgery,* 43, S85-90. 4. Benedetto, AV, et al. (2021). *J Eur Acad Dermatol Venereol,* 35(1) pp. 247-255. 5. Monk, E., et al. (2014). *Dermatologic Surgery,* 40(1), pp. 76–79. 6. Cubiró Raventós, X., et al. (2018). *SKINmed.* 17(5), pp. 298–304. 7. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed,* 10, S1–S7 8. Data on file, 2016 (Hospital Municipal de Quemados. Buenos Aires, Argentina). Stratpharma AG. 9. Wiseman, J., et al. (2019). *Clinical Rehabilitation,* doi: 10.1177/0269215519877516..

Hergestellt von: Stratpharma AG Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel Schweiz

CE 2797

Strataderm ist ein Medizinprodukt der Klasse I
Stratamed ist Medizinprodukt der Klasse IIa

Stratpharma Switzerland Heal Better™

SM-CH-019-2-0924