
Stratamed®

Moderne filmbildende
Wundauflage

Ein Durchbruch in der Wundheilung

Schnellere Heilung und frühzeitige Verhinderung anormaler Narben





www.stratamed.com

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

Die Bedeutung der Wundpflege

Ärzte führen viele komplexe und unterschiedliche Verfahren durch, die ein hohes Mass an Fachwissen erfordern. Trotz Befolgung der korrekten Behandlung, selbst mit den neuesten Technologien und Techniken, gibt es einige Risikofaktoren, die der Arzt nicht kontrollieren kann. Dazu gehören die **Einhaltung der Vorschriften durch den Patienten bei der Wundpflege, das Infektionsrisiko, andere Wundheilungskomplikationen sowie genetische Faktoren.**[1]
Eine verzögerte Epithelisierung über 10 bis 14 Tage hinaus führt zur **dramatischen Erhöhung** der Inzidenz der hypertrophen Narbenbildung.[2]

Unabhängig davon, ob es sich um eine chirurgische, ästhetische, akute oder chronische Wunde handelt, sind ein **angemessenes Wundmanagement und eine frühzeitige adäquate Nachsorge entscheidend,** um das bestmögliche medizinische und ästhetische Ergebnis zu erzielen, das Infektionsrisiko und abnorme Narbenbildung zu verringern, die Genesungszeit zu verkürzen und eine allgemeine Patientenzufriedenheit zu erreichen.[3]

Das Erscheinungsbild und die Nebenwirkungen von Narben können **erheblich verbessert** werden, wenn die Prävention unmittelbar nach dem Nähen oder dem Auftreten einer Wunde beginnt.[4]

Derzeitige Behandlung und Herausforderungen



Für die Behandlung verschiedener Wunden stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, doch viele Probleme wie **Antibiotikaresistenzen, wiederkehrende Infektionen und die Verwendung nicht optimaler Wundauflagen** bleiben bestehen.[5]

Zu den signifikanten negativen Auswirkungen topischer Antibiotika auf postoperative Wunden gehören verzögerte Wundheilung, allergische Kontaktdermatitis, entzündliche Chondritis, Anaphylaxie und das Stevens-Johnson-Syndrom.[6]

75% der Patienten (in den USA) verwenden weiterhin rezeptfreie, petrolatumbasierte topische Antibiotika **ohne** ärztliche Verschreibung, und **21,6% von ihnen entwickeln eine Kontaktdermatitis.**

In jüngsten klinischen Studien zeigte **Stratamed** die gleiche Wirksamkeit wie topische Antibiotika* bei der Verhinderung von Infektionen nach chirurgischen Eingriffen, jedoch **ohne Nebenwirkungen.**[6,7]

Viele **physikalische Wundauflagen** sind nur für Wunden auf flachen Oberflächen geeignet. Infolgedessen **ermöglichen** diese Wundauflagen bei vielen Wunden (z.B. in der Nähe von Gelenken, an stark konturierten Stellen oder bei tiefen und tunnelförmigen Wunden) **keinen vollständigen** Oberflächenkontakt. Zudem wurde auch gezeigt, dass die klebenden Teile dieser Verbände **allergische Reaktionen** hervorrufen können, die zu **Verzögerungen oder Komplikationen bei der Wundheilung führen.**[8-11]

Das **ideale Wundpflegeprodukt** sollte transparent sowie gasdurchlässig sein und sich leicht auf alle Wundoberflächen auftragen lassen.[12]

Bacitracin-Zink, Neomycinsulfat und Polymyxin-B-Sulfat (Neosporin® Original). | Bacitracin Zink (Bacitracin®).

Stratamed® - filmbildende Wundauflage für schnellere Wundheilung und frühzeitige Vorbeugung von abnormalen Narben

Es ist klinisch erwiesen, dass Stratamed Wunden bei Verbrennungen im Vergleich zur Standardbehandlung** **2-mal schneller heilt**[13] und die **Ausfallzeit verringert.**[14]

Stratamed ermöglicht die **Prävention abnormaler Narbenbildung** unmittelbar nach dem Nähen oder dem Auftreten einer Wunde.

Stratamed ist eine **wirksame Alternative zu topischen Antibiotika** zur Vorbeugung von Infektionen, ohne das Risiko einer Kontaktdermatitis.[6]

Eine Tube **Stratamed® ersetzt den Bedarf mehrerer Wundpflegeprodukte** wie herkömmliche Verbände, Hydrogele für die feuchte Wundheilung und topische Antibiotika zur Vorbeugung von Infektionen.

Stratamed ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa.

**Standardbehandlung: Silberverbände, Kollagenasen, Alginate



Stratamed®-Indikationen


Stratamed ist eine fortschrittliche flexible, filmbildende Wundauflage für die Anwendung **unmittelbar** nach medizinischen und ästhetischen medizinischen und ästhetischen Eingriffen, bei akuten oder chronischen Wunden und und geschädigten Hautoberflächen. Stratamed wurde mit einer speziellen Konsistenz entwickelt, die sicherstellt, dass es **vollständig** mit dem Wundbett oder der beschädigten Oberfläche **in Kontakt bleibt.**

MEDIZINISCHE INDIKATIONEN/VERFAHREN

- Chirurgische Inzisionen und Exzisionen
- Biopsien sowie Elektrodesikkation und Kürettage
- Allgemeine chirurgische Eingriffe, bei denen Nähte entstehen (z. B. Mohs-Chirurgie, Kaiserschnitt)
- Chronische Wunden (z.B. venöse, Druck- und diabetische Geschwüre)
- Verbrennungen 1. Und 2. Grades
- Durch Unfälle und/oder Traumata beschädigte Hautbarriere
- Kryochirurgie (z. B. bei aktinischer Keratose) und Dermabrasion
- Nach 5-fluorouracil (5-FU) Therapie
- Medizinische Tätowierung (z.B. nach einer Brustrekonstruktion)
- Entzündliche Haut

KOSMETISCHE INDIKATIONEN/VERFAHREN

- Laserverfahren (vollflächig ablativ)
- Platelet Rich Plasma (PRP)-Therapie
- Chemisches Peeling (mittel und tief)
- Kosmetische Chirurgie des Gesichts (z. B. Blepharoplastik, Lifts, Rhinoplastik)
- Kosmetische Chirurgie des Körpers (z. B. Brustvergrösserung/-verkleinerung, Liftings, Bauchdeckenstraffung)
- Entfernung von Tätowierungen
- Kosmetische und paramedizinische Tätowierungen



Warum ist Stratamed® ein innovatives Produkt?

FILMBILDENDE WUNDAUFLAGE
Stratamed-Gel trocknet zu einer dünnen und flexiblen Wundauflage, die einen dauerhaften Kontakt mit der Haut sicherstellt.

SCHNELLERE REEPITHELISIERUNG UND KÜRZERE AUSFALLZEIT
Stratamed fördert eine feuchte Wundheilungsumgebung, was zu einer schnelleren Reepithelisierung und einer kürzeren Ausfallzeit führt.

PRÄVENTION ABNORMALER NARBEN
Mit Stratamed kann die Vorbeugung von abnormaler Narbenbildung unmittelbar nach dem Eingriff (vor der Entfernung der Nähte) beginnen.

HYDRATATION UND GASDURCHLÄSSIGKEIT
Stratamed ist semi-okklusiv, wodurch die Haut und atmen kann und hydratisiert bleibt.

SYMPTOMATISCHE LINDERUNG
Stratamed lindert symptomatisch Juckreiz, Brennen und Unbehagen, reduziert Rötungen und Verfärbungen, die mit geschädigter Haut einhergehen.

SCHUTZ
Stratamed ist bakteriostatisch, schützt die geschädigte Haut vor dem Eindringen von Chemikalien und Mikroorganismen und minimiert gleichzeitig das Risiko einer Kontaktdermatitis.

SEKUNDÄRE AUFLAGEN
Stratamed kann mit oder ohne einer sekundären Schutzauflage, in Kombination mit anderen Wundtherapienund topischen Mitteln verwendet werden.

SCHWER ZU BEHANDELNDE BEREICHE
Stratamed ist ideal für freiliegende Bereiche wie Gesicht und Hals sowie für Gelenke und behaarte Stellen, ohne dass eine Rasur erforderlich ist.

NICHT-REAKTIV
Stratamed ist inert, hat keinen messbaren pH-Wert und enthält keine Steroide, Alkohol, Parabene oder Duftstoffe, so dass es für Säuglinge, Kinder, Menschen mit empfindlicher Haut, während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet ist.

EINFACHE ANWENDUNG
Stratamed ist einfach aufzutragen, ohne dass es vor dem erneuten Auftragen entfernt werden muss, und kann von den Patienten zu Hause angewendet werden.



Stratamed® vs. topische Antibiotika


In den USA wurde eine offene, randomisierte, einfach verblindete Studie mit 231 Patienten durchgeführt, um Stratamed und eine topische Dreifach-Antibiotika-Salbe (Bacitracin-Zink, Neomycin-Sulfat und Polymyxin B-Sulfat, Neosporin® Original) hinsichtlich der Infektionsrate, der Häufigkeit von Kontaktdermatitis und der Heilungsqualität zu vergleichen.[6]

Benedetto, AV, Staidle, JP, Schoenfeld, J., Benedetto, EA, Benedetto, PX (2021). 'Comparing the use of a novel antibiotic-free film-forming topical wound dressing versus a topical triple antibiotic in dermatologic surgical procedures including Mohs micrographic surgery', *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 35(1), pp. 247-255.

Stratamed ist als antibiotikafreies Gel **eine brauchbare Alternative** zu Triple-Antibiotika (TA) oder anderen Produkten auf Petrolatum-Basis, mit oder ohne Antibiotika.

Stratamed ist bei der Vorbeugung von Infektionen **genauso wirksam wie TA**, ohne das Risiko einer Kontaktdermatitis.

Stratamed fördert eine **schnellere Heilung, eine geringere Hautrötung und eine bessere Qualität des neu gebildeten Gewebes.**




Klinische Ergebnisse

Sofort nach der Behandlung | Nach 7 Tagen Behandlung | Nach 7 Monaten Behandlung

Stratamed
Stratamed ist bakteriostatisch



Dreifach-Antibiotika-Salbe
(Bacitracin-Zink, Neomycin-Sulfat und Polymyxin B-Sulfat, Neosporin® Original)



In den USA wurde eine randomisierte, einfach verblindete Split-Scalp-Studie mit 19 Patienten durchgeführt, um Stratamed mit einem topischen Antibiotikum (Bacitracin-Zink, Bacitracin®) zu vergleichen. Bewertet wurden dabei Ödeme, Erytheme, Krustenbildung, Heilungsreaktion und Ergebnispräferenz nach einer Haartransplantation (FUE = Follicular Unit Extraction).[7]


James, IB, Turer, DM, DiBernardo, BE (2022). 'Comparison of a Novel Silicone Gel Wound Dressing vs Bacitracin After Follicular Unit Extraction Hair Transplantation', *Aesthetic Surgery Journal Open Forum*, 4, pp. 1-8.

Stratamed **eliminiert das Risiko der Förderung bakterieller Resistenzen und der signifikanten** Veränderung des Hautmikrobioms.

Schnellere Heilungsreaktion wurde bereits am 1. Tag in der Stratamed-Gruppe beobachtet.


- Stratamed ist **genauso wirksam wie topische Antibiotika** bei der Reduktion von Entzündungen (Ödeme, Erytheme und Krustenbildung).

Nach 1 Tag nach dem Eingriff



Stratamed | Antibiotikum

Klinische Ergebnisse: Verbrennungen



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 6 Tagen der Behandlung mit Stratamed

- Bei der Anwendung von Stratamed traten **keine sekundären Wundinfektionen oder allergischen Reaktionen auf.**
- Stratamed zeigte eine **geringere Inzidenz von Schmerzen und Juckreiz** im Vergleich zur Standardbehandlung.

Lucattelli, E., Cipriani, F., Pascone, C., Di Lonardo, A. (2021). 'Non-Healing Burn Wound Treatment With A Sterile Silicone Gel', *Annals of Burns and Fire Disasters*, 34(1), pp. 53-57.

*Standardbehandlung: Silberverbände, Kollagenasen, Alginate

Verbrennungen mit verzögerter Reepitehiliserung – Bein[13]

Stratamed **beschleunigt den Heilungsprozess - 2-mal schnellere Wundheilung** im Vergleich zur Standardbehandlung.*

Die durchschnittliche Zeit bis zum Erreichen einer Reepithelisierung von 95% betrug 5,4 Tage in der Stratamed-Gruppe gegenüber 12,5 Tagen in der Gruppe mit Standardbehandlung.



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 18 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Verbrennungen 2. Grades Gesicht[15]

Ein 6-jähriger Junge erlitt eine Verbrennung zweiten Grades im Gesicht.

Hospical Municipal de Quemados, Buenos Aires, Argentina



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 6 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 9 Tagen der Behandlung mit Stratamed


Verbrennung zweiten Grades - Fuss[15]

Ein 2-jähriger Junge erlitt eine Verbrennung zweiten Grades am rechten Fuss.

Hospital Municipal de Quemados. Buenos Aires, Argentina.



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 11 Tagen der Behandlung mit Stratamed




Nach 36 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Verbrennung zweiten Grades - Brust[16]

Eine 75-jährige Frau erlitt eine 5 x 4 cm grosse, nicht infizierte Verbrennung zweiten Grades an der rechten Brust.

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona, Spain

Klinische Ergebnisse: Chronische Wunden



4 Monate nach der Operation, Beginn der Behandlung mit Stratamed[17]



Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed



2 Jahre nach der Operation, Beginn der Behandlung mit Stratamed[17]



Nach 5 Wochen der Behandlung mit Stratamed

Monk, E., et al. (2014). 'Successful Treatment of Nonhealing Scalp Wounds Using a Silicone Gel', *Dermatologic Surgery,* 40(1), pp. 76–79.


„Wir glauben, dass dieses Gel ein Hauptgrund dafür war, dass bei allen Patienten eine Verbesserung und Heilung ihrer Kopfhautwunden eintrat, nachdem diese über einen längeren Zeitraum nicht geheilt waren."

„Stratamed für unsere Patienten nutzt die einzigartigen Eigenschaften von filmbildenden Gelen in einer Formulierung, die für diese Wunden ideal sein kann."

Prof. Anthony Benedetto, MD, DO, FACP, Philadelphia, USA



Beginn der Behandlung mit Stratamed[12]



Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 6 Wochen der Behandlung mit Stratamed

Marini, L et al. (2017). 'Importance of Scar Prevention and Treatment—An Approach From Wound Care Principles, *Dermatologic Surgery,* 43, S85-S90.

- Bei chronischen Wunden bewirkt Stratamed einen effektiven "Heilungsschub" für biologisch inaktives Granulationsgewebe und fördert die Reepithelisierung bereits nach einer Woche Behandlung.
- Stratamed ist wirksam bei hartnäckigen ulzerativen Läsionen nach chirurgischen Eingriffen und anschliessenden partiellen Hauttransplantationen.



Vor Beginn der Behandlung mit Stratamed[18]



Unmittelbar nach dem Debridement der grossen Kruste. Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 2 Wochen der Behandlung mit Stratamed

Uva, L., et al. (2015). 'Erosive pustular dermatosis successfully treated with a novel silicone gel', *International Journal of Dermatology,* 55(1), pp. 89–91.

- Stratamed verhindert die Mazeration der die Wunde umgebenden Haut, wodurch Verbandswechse seltener erforderlich sind, obwohl in keinem der veröffentlichten Fälle sekundäre Verbände erforderlich waren.

Klinische Ergebnisse: Weitere Indikationen



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 15 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 40 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 78 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 90 Tagen der Behandlung mit Stratamed

*Erstbehandlung: Hydrogel und Hydrofasern mit Alginat, Kollagenase mit Chloramphenicol-Salbe, Sonnenblumenöl mit Fettsäuren.

Dekubitus – Sakral[19]

26-jähriger Mann mit sakraler Druckläsion des Grades 3, verursacht durch einen längeren Krankenhausaufenthalt.

Vorgeschichte von Adipositas Grad II

Grösse der Wunde: 12 x 8 cm

Die erwartete Heilungszeit betrug 1,5-3 Jahre bei der Behandlung*, die vor Beginn der Stratamed-Anwendung durchgeführt wurde.


Nach 7-tägiger Behandlung wurden verringerte Exsudation sowie eine beschleunigte Annäherung der Wundränder festgestellt.

Nach 90 Behandlungstagen war der Dekubitus abgeheilt und der Patient konnte entlassen werden.

Krankenpflegerin Vanessa Neckel, Brasilien



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 18 Tagen der Behandlung mit Stratamed




Nach 31 Tagen der Behandlung mit Stratamed

DFS (Diabetisches Fusssynrdom)[20]

Madrid, Spanien



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 14 Tagen der Behandlung mit Stratamed



Nach 21 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Ulcus cruris Syndrom (schwer)[21]

Unterschenkel, >90 Tage offen

Dr. Strohal, Federal Academic Teaching Hospital, Feldkirch, Österreich



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Vollhaut-Spenderstellenwunde[22]

Daten in den Unterlagen,, Stratpharma AG.

Klinische Ergebnisse: Operationen



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 10 Tagen der Behandlung mit Stratamed




Nach einem Monat der Behandlung mit Stratamed

BCC (Basalzellkarzinom) – Kopf[16]

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona, Spanien



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 2 Monaten der Behandlung mit Stratamed

SCC (Plattenepithelkarzinom) – Kopf[16]

Chirurgische Exzision und Hautlappenrekonstruktion.

Dr. Cubiró, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona, Spanien



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 2 Monaten der Behandlung mit Stratamed

Mohs – Chirurgie – Lippe[23]

Chirurgische Exzision an der Oberlippe.

Daten in den Unterlagen, Stratpharma AG



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 8 Wochen Behandlung mit Stratamed

Linearer Einschnitt – Kopf[14]

Dr. Sandhofer, Linz, Österreich

Klinische Ergebnisse: Ästhetische Verfahren



Vor der Behandlung



Nach dem Eingriff, Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 7 Tagen der Behandlung mit Stratamed

Laser-Regenerierung (Aknenarben)[14]

Behandlung mit Stratamed in Kombination mit Thermage® und CO_2 - Fractional Laser Regenerierung.
Dr. Sandhofer, Linz, Österreich



Vor der Behandlung



Bei dem Eingriff und des Beginns der Behandlung mit Stratamed



Nach 10 Wochen der Behandlung mit Stratamed

Hypertrophe Narbe nach Thoraxoperation[14]

Behandlung mit Stratamed in Kombination mit CO_2/Mosaic Fractional Laser Regernerierung und Radiofrequenz.

Dr. Sandhofer, Linz, Österreich



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 5 Monaten der Behandlung mit Stratamed

Hypertrophe Narbe nach Mammareduktionsplastik[14]

Stratamed in Kombination mit CO_2 Laser

Dr. Sandhofer, Linz, Österreich



Beginn der Behandlung mit Stratamed



Nach 9 Tagen der Behandlung mit Stratamed

IPL (Intensive Pulslichttherapie) - Arm[24]

Sydney, Australien

Wie ist Stratamed® anzuwenden?

- Stellen Sie sicher, dass die betroffene Haut oder Wunde sauber ist.
- Vor dem Auftragen des Gels tupfen Sie so viel überschüssiges Exsudat oder Wundflüssigkeit wie möglich vorsichtig ab.

Bei geschädigter oder rissiger Haut, die keinen Sekundärverband erfordert:




Tragen Sie eine **sehr dünne Schicht** Stratamed auf die betroffene Stelle auf und **lassen Sie das Gel trocknen.**

Bei ordnungsgemässer Anwendung auf den betroffenen Hautstellen sollte Stratamed innerhalb **von 5–6 Minuten** getrocknet sein. Sollte die Trockenzeit überschritten werden, wurde ggf. zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Mull abtupfen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen.

Stratamed sollte **ein- bis zweimal täglich,** oder wie von Ihrem Arzt verordnet, auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden.

Nach dem Trocknen können auf den Stratamed-Gelfilm Sonnencremes oder Kosmetika aufgetragen, sowie Druck- oder Gipsverbände angelegt werden.

Bei geschädigter Haut oder Wunden die einen Sekundärverband erfordern:



Stratamed **dünn auftragen** und anschliessend mit dem Sekundärverband abdecken. **Trocknen ist nicht notwendig.**

Stratamed sollte **beim Wechseln des Verbandes oder beim Überprüfen des Wundfortschritts** erneut aufgetragen werden, oder nach Anweisung Ihres Arztes.

Zusätzliche Hinweise

- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Stratamed **dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist** (24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche).
- Stratamed kann **häufiger** erneut aufgetragen werden, um einen konstanten Kontakt mit der Haut zu gewährleisten oder um die Symptome zu lindern.
- Durch Waschen wird Stratamed wahrscheinlich entfernt. Wenn Stratamed durch Waschen entfernt wurde, sollte es erneut aufgetragen werden.
- Stratamed kann **direkt** auf die Haut aufgetragen werden, z.B. mit dem Finger, Wattestäbchen, etc.
- Stratamed **absorbiert weder** Exsudat **noch** Wundflüssigkeit. Der von Stratamed gebildete Film verhindert nicht, dass die Flüssigkeit aus der Wunde austritt.
- Stratamed **muss nicht eingerieben oder massiert werden,** da es nicht unter das Stratum corneum (oberste Schicht der Haut) eindringt und seine Wirkung nicht verstärkt.
- Stratamed kann in Kombination mit saugfähigen Wundauflagen verwendet werden. Tragen Sie Stratamed direkt auf die Wunde oder auf die Kontaktseite des Sekundärverbands auf.
- Das Auftragen von Stratamed auf die Wundränder hilft, Mazeration zu verhindern.
- Wenn es nicht vollständig getrocknet ist, kann Stratamed Kleidung färben. Normales Waschen entfernt das Produkt nicht aus der Kleidung. Bei Verfärbungen sollte chemische Reinigung die Flecken entfernen können, ohne den Stoff zu beschädigen.

Stratamed® und weitere Produkte

Stratamed **sollte nicht über topischen Medikamenten angewendet werden,** ausser vom Arzt angeraten.

WICHTIG:

Da Stratamed semi-okklusiv ist:

- **Stratamed kann die Wirkung eines Wirkstoffs verstärken, wenn Stratamed über dem Wirkstoff aufgetragen wird.**
- **Stratamed kann die Aufnahme von Wirkstoffen verhindern oder verringern, wenn diese über Stratamed aufgetragen werden.**

Wie viel Stratamed® benötige ich?



Stratamed-Gel ist eine fortgeschrittene Formulierung, die pro Anwendung **erheblich weniger Produkt** erfordert als typische Feuchtigkeitscremes oder -gele.



Stratamed 5g

reicht aus um einen linearen Einschnitt von 2-4 cm zweimal am Tag für über 90 Tage zu behandeln.

Stratamed 10g

reicht aus um einen linearen Einschnitt von 5-8 cm zweimal am Tag für über 90 Tage zu behandeln.

Stratamed 20g

reicht aus um einen linearen Einschnitt von 10-12 cm zweimal am Tag für über 90 Tage zu behandeln oder eine Fläche von 6 x 12 cm zweimal am Tag für über 60 Tage.

Stratamed 50g

reicht aus um eine Fläche von 12 x 15 cm zweimal am Tag für über 60 Tage zu behandeln.

Empfohlene Behandlungsdauer

- Stratamed sollte **direkt nach der Behandlung** aufgetragen und bis zur vollständigen Heilung weiter verwendet werden.


- Bei regenerierenden und ablativen Behandlungen wird eine durchgehende Behandlung von **mindestens 30 Tagen** empfohlen oder bis keine weitere Verbesserung mehr sichtbar ist.

Sobald die Wunde verheilt ist oder die Nähte entfernt wurden:

Strataderm - zur Vorbeugung und Behandlung von abnormen Narben, sowohl alten als auch neuen

Strataderm®
Gel zur Behandlung von Narben

- Einfache Anwendung einmal täglich*
- Macht erhöhte Narben weicher und flacher
- Lindert Juckreiz und Unbehagen der Narben.
- Mindert Rötungen und Verfärbungen der Narben



*Bitte beachten Sie die Packungsbeilage (PIL).

Stratamed®

Moderne filmbildende
Wundauflage

Ein Durchbruch in Wundheilung und der Vorbeugung anormaler Narben

Stratamed:

- Ist zur unmittelbaren Anwendung nach ästhetischen und medizinischen Eingriffen, bei chronischen oder akuten Wunden und geschädigten Hautoberflächen geeignet.
- Fördert ein feuchtes Heilungsmilieu, das eine schnellere Reepithelisierung und kürzere Ausfallzeiten ermöglicht
- Ermöglicht die Vorbeugung abnormaler Narbenbildung frühere als je zuvor (bereits vor der Entfernung der Nähte).
- Ist gasdurchlässig, sodass die Haut atmen und hydratisiert bleiben kann.
- Ist bakteriostatisch und reduziert das Infektionsrisiko
- Lindert Juckreiz, Unbehagen und reduziert Rötungen und Verfärbungen, die mit geschädigter Haut einhergehen.
- Es ist inert und enthält keinen Alkohol, keine Parabene oder Duftstoffe
- Lässt sich leicht auf alle Wundoberflächen auftragen, ohne dass es vor dem erneuten Auftragen entfernt werden muss.



Bei Fragen zu Stratpharma-Produkten, Bestellungen, Beschaffung usw., wenden Sie sich bitte an unseren Hauptsitz: +41 (0) 61 691 12 80 oder inquiries@stratpharma.com

www.stratamed.com

Achtung: Lesen Sie stets das Etikett und verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. Nur zur äusserlichen Anwendung. Stratamed sollte nicht mit den Augen in Kontakt kommen. Stratamed sollte nicht über topische Medikamente aufgetragen werden, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Stratamed kann Kleidung verfärben, wenn es nicht vollständig getrocknet ist. Sollte eine Verfärbung auftreten, sollte eine chemische Reinigung in der Lage sein, sie ohne Beschädigung des Stoffes zu entfernen. Verschliessen Sie die Tube nach Gebrauch für eine korrekte Lagerung fest mit der Kappe. Sollte Ihre Wunde Anzeichen einer Infektion zeigen oder nach 30 Tagen nach der ersten Anwendung des Produkts nicht heilen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Bei Reizung stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Nicht geeignet für stark exsudierende Wunden, Tunnelwunden oder Verbrennungen dritten Grades. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht nach dem auf der Tube aufgedruckten Verfallsdatum (EXP) verwenden. Das Verfallsdatum (EXP) ändert sich nicht, sobald die Tube geöffnet wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Tube beschädigt ist. Stratamed erfordert keine speziellen Entsorgungsmethoden. Bitte folgen Sie den örtlichen Entsorgungsvorschriften. Für weitere Anweisungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage (PIL). Steril bis zum Öffnen. **Inhaltsstoffe:** Polysiloxane, Siloxanharz.

Quellen: 1. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(1), pp. 113-116. 2. Gauglitz, GG, et al. (2011). *Mol Med*, 17(1-2), pp. 113-125. 3. Upton, Z., et al. (2011). *Wounds International*, 2(1), pp. 1-2. 4. Bayat, A., et al. (2003). *BMJ*, 326, pp. 88-92. 5. Gold, M., Biron, J. (2019). *J Cosmet Dermatol*, 18(2), pp. 524-529. 6. Benedetto, AV, et al. (2021). *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 35(1) pp. 247-255. 7. James, IB, et al. (2022). *Aesthetic Surgery Journal Open Forum*, 4, pp. 1-8. 8. Whitney, J., et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 663-679. 9. Steed, DL, et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 680-692. 10. Hopf, HW, et al. (2006). *Wound Repair Regen*, 14, pp. 693-710. 11. Bamberg, R., et al. (2002). *Wounds*, 14, pp. 314-327. 12. Marini, L., et al. (2017). *Dermatologic Surgery*, 43, S85-90. 13. Lucattelli, E., et al. (2021). *Annals of Burns and Fire Disasters*, 34(1), pp. 53-57. 14. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed*, 10, S1-S7. 15. Data on file, 2016 (Hospital Municipal de Quemados. Buenos Aires, Argentina). Stratpharma AG. 16. Cubiró Raventós, X., et al. (2018). *SKINmed.* 17(5), pp. 298-304. 17. Monk, E., et al. (2014). *Dermatologic Surgery*, 40(1), pp. 76-79. 18. Uva, L., et al. (2015). *International Journal of Dermatology*, 55(1), pp. 89-91. 19. Data on file, 2022 (Nurse Vanessa Neckel, Brazil), Stratpharma AG. 20. Data on file, 2010 (Madrid, Spain). Stratpharma AG. 21. Data on file, 2016 (Federal Academic Teaching Hospital. Feldkirch, Austria). Stratpharma AG. 22. Data on file. Stratpharma AG. 23. Presented in International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) 2015. (Spring) by Dr. Benedetto, Cartagena (Colombia). 24. Data on file (Sydney, Australia). Stratpharma AG.

Hergestellt von: Stratpharma AG Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Schweiz

CE 2797 Medizinprodukt der Klasse IIa

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

SM-CH-028-2-0824